



DIRECCIÓN DE RED DE SALUD ALTO
AMAZONAS
BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO
SEMANAL
ÁREA DE EPIDEMIOLOGÍA



"Aumento de tos ferina (coqueluche) en la Región de las Américas."

Durante la década del 2010 a 2019, al nivel mundial, se notificaron en promedio 170.000 casos anuales de tos ferina (coqueluche). Sin embargo, durante la pandemia de COVID-19 se observó un descenso importante, con un promedio de 80.227 casos anuales entre 2020 y 2023, lo que representa una reducción de aproximadamente dos veces con respecto al periodo anterior. El año 2021 marcó el mínimo histórico reciente, con solo 29.623 casos notificados a nivel mundial, para luego aumentar el 2022 y 2023 con 63.024 y 158.910 casos. Actualmente, la Región de las Américas cuenta con 43.751 casos como un total provisional para el año pasado del 2024. La tos ferina, también conocida como tos convulsiva, es una enfermedad respiratoria aguda causada por la bacteria ***Bordetella pertussis***. Se transmite por vía aérea y se caracteriza por accesos intensos de tos que pueden dificultar la respiración. Es altamente contagiosa y puede ser especialmente peligrosa en lactantes y niños pequeños no inmunizados. En la Región de las Américas que actualmente presentan brotes de tos ferina en el año 2025. Cuatro de los siete países analizados Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú. En Brasil, desde la SE 1 y hasta la SE 19 del 2025 se notificaron 1.634 casos confirmados de tos ferina, incluyendo cinco defunciones (5). En Colombia, desde la SE 1 hasta SE 18 del 2025 se reportaron 318 casos confirmados de tos ferina, incluyendo dos defunciones. En Ecuador, desde la SE 1 y hasta la SE 19 del 2025, se han notificado un total de 593 casos de tos ferina, incluyendo 15 defunciones. En Paraguay, entre la SE 1 y la SE 19 del 2025, se reportaron 37 casos confirmados de tos ferina incluyendo dos defunciones, de este total, 33 casos son confirmados por laboratorio y cuatro por nexo epidemiológico.

En Perú, desde la SE 01 y hasta la SE 19 del 2025, se han reportado 404 casos confirmados y 219 casos probables de tos ferina, incluyendo 13 defunciones. El total de casos de tos ferina para el año 2025, es el más alto reportado desde el 2013 en el país, en 2025 departamentos con casos confirmados y probables de tos ferina, los con el mayor número de casos son Loreto (462 casos, incluyendo 11 defunciones), Lima (42 casos, incluyendo una defunción), Callao (24 casos), Cajamarca (16 casos) y Cusco (15 casos). El grupo edad más afectado son los niños de 1 a 4 años (199 casos) representando 31,9%, seguido de los grupos de menores de un año (145 casos) representando 23,3% y los de 5 a 11 años (136 casos) representando 21,8%.

Director de la Red de Salud
Obst. Percy Sanchez Vergaray.
Área de Epidemiología.
Lic. Enf. Nelly L. Escobar Ramos.
Equipo Técnico:
Lic. Enf. Marleny B. Muñoz Quispirina.
C.D. Daniel A. Barrutia Araujo.
Blgo. Karen Huaman Silva
Tec. Enf. Ana A Peltroche Córdova.
Tec. Enf. Léster Lenin Vela Tello.
Tec. Enf. Cesia K. Saavedra Shapiama.
Email:epide160201@yahoo.com
Web:www.diredsa.gob.pe

DAÑOS NOTIFICADOS EN LA SEMANA

Infecciones respiratorias agudas	305
EDA acuosa	137
Dengue sin señales de alarma	75
Neumonía <5 años	09
Dengue con Señales de Alarma	07
Eda Disentérica	06
Sífilis N/E	05
Leishmaniasis cutánea	03
Tos Ferina	03
Ofidismo	01
Malaria por p. Vivax	01
Ioxocelismo	01
Varicela S/C	01
Mayaro	01
Leptospirosis	00
Malaria por p. falciparum	00

SITUACIÓN DE SALUD**I.- ENFERMEDADES TRASMITIDAS POR VECTORES****1.1.- MALARIA POR PLASMODIUM VIVAX Y FALCIPARUM**

El año 2025 hasta la S.E. 22 se ha notificado a nivel Provincial 65 casos de Malaria, con un promedio semanal de 03 casos, Tasa de incidencia acumulada (TIA) de 0.51 por 1000 habitantes. El 100% (65) de los casos corresponde a Plasmodium Vivax y el 0% (0 casos) a Plasmodium Falciparum.

El Distrito de Balsapuerto reporta la mayor incidencia de casos 1.48 por 1000 habitantes de los casos de Malaria en la provincia de Alto Amazonas.

En la Semana Epidemiológica (SE) 22- 2025, se notificó 01 caso de malaria a nivel provincial, reportándose una Disminución del 76 % (202) casos que el año 2024 en el mismo período. Tabla N°01.


Tabla N°01. Casos de malaria por inicio de síntomas, Provincia de Alto Amazonas, 2025 a la (S.E.22)

Distritos	2024				2025				Variación 2024 - 2025	Comportamiento del año 2025 en relación al 2024
	SE-22	Acumulado SE-22	TIA(1000 hab.)	Defunciones	SE-22	Acumulado SE-22	TIA(1000 hab.)	Gestante		
Balsapuerto	5	171	9.39	0	1	27	1.48	0	0	-144
Jeberos	0	0	0.00	0	0	7	1.29	0	0	7
Lagunas	0	34	2.32	0	0	2	0.14	0	0	-32
Santa Cruz	0	0	0.00	0	0	2	0.44	0	0	2
Tnte. Cesar Lopez Rojas	0	0	0.00	0	0	1	0.14	0	0	1
Yurimaguas	7	62	0.81	0	0	26	0.34	0	0	-36
Provincia de Alto Amazonas	12	267	2.12	0	1	65	0.51	0	0	-202

Fuente: Notiweb-Individual

Elaborado: Área de Epidemiología-DIREDSA

Figura N° 01. Canal de casos de malaria en la Provincia de Alto Amazonas – 2025 a la S.E. 22.




Fuente: Notiweb-Individual

Elaborado: Área de Epidemiología-DIREDSA

El canal endémico provincial para Malaria muestra; en la semana 03 tenemos un leve ingreso a **zona de alarma**, semanas posteriores hasta la actualidad continuamos en **zona de éxito**. Por lo que es necesario adoptar medidas de control de manera inmediata en las localidades afectadas. La situación de esta semana epidemiológica posiblemente responde a los habituales retrasos en la notificación. (Figura N° 01).

Figura N°02. Casos de Malaria, Provincia de Alto Amazonas 2014-2025.




Fuente: Notiweb-Individual

Elaborado: Área de Epidemiología-DIREDSA

Según la curva epidemiológica, que desde el año **2014 al 2018** la tendencia fue al incremento; sin embargo, en los años 2019-2021 se redujo el número de casos en un 78.8%. Entre los años 2022-2023 los casos se acrecentaron en un 61.5%, en comparación al año anterior; en **2024** se observa una evidente reducción de casos con **72.1%** en relación al año **2023**; lo que va del presente año, tenemos notificados **65** casos de malaria Vivax hasta la S.E 22 lo que representa una TIA de **0.51 x1000 hab.**

Figura N° 03. Casos de Malaria por grupo de edades Provincia de Alto Amazonas 2025.




Fuente: Notiweb-Individual

Elaborado: Área de Epidemiología-DIREDSA

La mayoría de casos corresponde a la etapa de vida niña-niña (0-11 años), con 37% (24 casos), seguido por etapa adolescentes (12 -17 años) con el 25% (16 casos), Adulto (30-59 años) con 15% (10 casos), de Adulto joven (18 - 29 años) con 20% (13 casos), Adulto Mayor (>60) con 3% (02 casos), y (Figura N°03).

Figura N° 04. Mapa de Riesgo, Provincia de Alto Amazonas, 2025.



Fuente: Notiweb-Individual

Elaborado: Área de Epidemiología-DIREDSA

Según nuestra Figura N° 04, la S.E. N° 22 el distrito de Santa Cruz, Lagunas, Tnte. Cesar Lopez Rojas y Yurimaguas, el Distrito de Jeberos y Balsapuerto, se encuentra el Bajo Riesgo. Es necesario continuar con las actividades de prevención y control de esta enfermedad priorizando las localidades que se encuentran en mayor riesgo.

1.2.- DENGUE

El dengue representa un desafío creciente para la salud pública en Perú, intensificado por brotes frecuentes que se ven agravados por la alta densidad poblacional en áreas urbanas y factores ambientales que favorecen la proliferación del mosquito Aedes aegypti, portador del agente causal. El cambio en las condiciones climáticas, incluyendo el aumento de las temperaturas y las variaciones en los patrones de lluvia, ha intensificado este problema.

En este año 2025 la Provincia de Alto Amazonas hasta la S.E. N° 22 notifica 1541 casos de dengue, de estos el 42% (641 casos) son probables y el 58% (900 casos) son confirmados, Además, se observa un incremento en el número de casos de dengue en comparación con el año 2024. Se ha notificado 01 defunción en el distrito de Yurimaguas. Según la forma clínica de la enfermedad el 89.5% (1374) son casos de Dengue sin signos de alarma, 10.2% (163) casos de Dengue con señales de alarma y 0.3% (4) Dengue Grave (tabla 2). En cuanto al serotipo del virus del dengue que circulan en la provincia de Alto Amazonas predominan la presencia de 3 serotipos, DEN-1, DEN-2, DEN-3.


Tabla N° 02. Casos de dengue por inicio de síntomas y por distritos de la Provincia de Alto Amazonas 2024-2025.

Distritos	2024					2025					Variación 2024 - 2025	Comportamiento del año 2025 en relación al 2024
	SE 22	Acumulado SE 22	TIA(1000 hab.)	Gestante	Defunciones	SE 22	Acumulado SE 22	TIA(1000 hab.)	Gestante	Defunciones		
Balsapuerto	0	0	0.00	0	0	1	18	0.70	0	0	18	INCREMENTO
Jeberos	0	3	0.55	0	0	2	67	9.71	0	0	64	INCREMENTO
Lagunas	8	152	10.36	0	0	8	163	10.78	0	0	11	INCREMENTO
Santa cruz	0	0	0.00	0	0	2	32	5.94	0	0	32	INCREMENTO
Tnte. Cesar Lopez Rojas	0	1	0.14	0	0	0	37	5.24	0	0	36	INCREMENTO
Yurimaguas	46	1267	16.38	0	0	36	1224	11.94	5	0	-43	DISMINUCIÓN
Provincia de Alto Amazonas	54	1423	11.18	0	0	49	1541	9.47	5	0	118	INCREMENTO

Fuente: Notiweb-Individual

Elaborado: Área de Epidemiología-DIREDSA

Figura N° 05. Tendencia semanal de casos de dengue en la Provincia de Alto Amazonas, 2021-2025 hasta S.E 22.




Fuente: Notiweb-Individual

Elaborado: Área de Epidemiología-DIREDSA

La incidencia de casos en el año 2022 fue de 20.80% x 1000 hab., se reportó un acumulado de 2947 casos con 4 fallecidos, en el año 2023 la incidencia fue de 17.49% x1000 hab, se reportó 2201 casos, mientras que en el año 2024 la incidencia fue de 45.21% x 1000 hab, los casos persistieron durante todo el año con un promedio de 86 casos por semana epidemiológica, alcanzando el pico más alto con un acumulado de 4447 casos , en lo que va del año 2025 la incidencia de casos es de 9.0% x 1000 hab, hasta la S.E 22 se reportan 1541 casos con 01 fallecido.

Figura N° 06. Canal endémico de casos de dengue en la Provincia de Alto Amazonas – 2024-2025 hasta S.E. 22.




Fuente: Notiweb-Individual

Elaborado: Área de Epidemiología-DIREDSA

El canal Endémico en el año 2024 hubo un pico epidémico significativo en cierto periodo, mientras que en 2025 los casos prevalecen con una leve disminución y se encuentra **zona de epidemia**. Es importante señalar que este enfoque corresponde a la dinámica de la enfermedad, por lo que resulta imperativo tomarlo con cautela y tener en cuenta que los pronósticos pueden variar con la actualización periódica de datos semanales.

Figura N° 07. Casos de dengue por grupo de edades Provincia de Alto Amazonas 2025.

Etapas de Vida	Femenino	Masculino	TTT	%
Niños (0 - 11 años)	225	280	505	33
Adolescentes (12 - 17 años)	125	128	253	16
Adulto Joven (18 - 29 años)	154	95	249	16
Adulto (30 - 59 años)	260	176	436	28
Adulto Mayor (60 a mas años)	50	48	98	6
Total	814	727	1541	100



Fuente: Notiweb-Individual

Elaborado: Área de Epidemiología-DIREDSA

La mayoría de los casos corresponde a la etapa de vida Adulto (30-59 años) con 28% (436 casos), seguido de vida niña-niña (0-11 años), con 33% (505 casos), seguido de Adulto joven (18 - 29 años) con 16 % (249 casos) por etapa adolescentes (12 -17 años) con el 16% (253 casos) y etapa Adulto Mayor (>60) con 6% (98 casos) (Figura N°07).

1.3.- LEISHMANIASIS (B55.1, B55.2)

La Leishmaniasis es una enfermedad causada por protozoos del género de leishmania, transmitida por la picadura de flebótomos (mosquito de arena). La leishmaniasis es un problema de salud en regiones tropicales y subtropicales. Hasta la S.E 22 se han notificado en el acumulado de 20 casos de Leishmaniasis probables, el 95% (19 casos) por Leishmaniasis cutánea y el 5% (01 caso) por leishmaniosis mucocutánea.

1.3.1.- LEISHMANIASIS CUTÁNEA

La Leishmaniosis Cutánea es la forma más común de esta enfermedad parasitaria y es causada por protozoos del género de leishmania, provocando ulceras en la piel que puedan causar cicatrices. Este año 2025 en esta semana no se presentó caso, se tiene un acumulado de 19 casos con una TIA de 0.12 x 1000 habitantes. Los distritos con incremento son Jeberos, Lagunas, Santa Cruz y Tnte Cesar López Rojas.

Tabla N° 03. Casos de Leishmaniasis Cutánea por inicio de síntomas y por distritos de la Provincia de Alto Amazonas 2024-2025.

Distritos	2024				2025				Variación 2024 - 2025	Comportamiento del año 2025 en relación al 2024
	SE 22	Acumulado SE 22	TIA(1000 hab.)	Defunciones	SE 22	Acumulado SE 22	TIA(1000 hab.)	Defunciones		
Balsapuerto	0	7	0.38	0	0	1	0.04	0	-6	DISMINUCIÓN
Jeberos	1	1	0.18	0	0	2	0.29	0	1	INCREMENTO
Lagunas	0	1	0.07	0	0	2	0.13	0	1	INCREMENTO
Santa Cruz	0	2	0.44	0	0	5	0.93	0	3	INCREMENTO
Tnte. Cesar Lopez Rojas	0	1	0.14	0	0	6	0.85	0	5	INCREMENTO
Yurimaguas	0	7	0.09	0	0	3	0.03	0	-4	DISMINUCIÓN
Provincia de Alto Amazonas	1	19	0.15	0	0	19	0.12	0	0	SIN VARIACIÓN

Fuente: Notiweb-Individual

Elaborado: Área de Epidemiología-DIREDSAA

1.3.2.- LEISHMANIASIS MUCOCUTÁNEA

Es una enfermedad severa de leishmaniasis, causada principalmente por leishmania braziliensis y se transmite a través de la picadura de los flebótomos(lutzamyia). Afecta la piel y las membranas mucosas de la nariz, boca y garganta en lo cual puede causar deformaciones graves. Hasta la semana N° 22 se tiene como acumulado de 01 caso, se debe continuar con la búsqueda activa.


Tabla N° 04. Casos de Leishmaniasis Mucocutánea por inicio de síntomas y por distritos de la Provincia de Alto Amazonas 2024-2025.

Distritos	2024				2025				Variación 2024 - 2025	Comportamiento del año 2025 en relación al 2024
	SE 22	Acumulado SE 22	TIA(1000 hab.)	Defunciones	SE 22	Acumulado SE 22	TIA(1000 hab.)	Defunciones		
Balsapuerto	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	SIN VARIACIÓN
Jeberos	0	1	0.18	0	0	1	0.14	0	0	SIN VARIACIÓN
Lagunas	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	SIN VARIACIÓN
Santa Cruz	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	SIN VARIACIÓN
Tnte. Cesar Lopez Rojas	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	SIN VARIACIÓN
Yurimaguas	0	2	0.03	0	0	0	0.00	0	-2	DISMINUCIÓN
Provincia de Alto Amazonas	0	3	0.02	0	0	1	0.01	0	-2	DISMINUCIÓN

Fuente: Notiweb-Individual

Elaborado: Área de Epidemiología-DIREDSAA


Figura N° 08. Casos de Leishmaniasis cutánea y mucocutánea por grupo de edad 2025.



Fuente: Notiweb-Individual

Elaborado: Área de Epidemiología-DIREDSA

Figura N° 09. Casos de Leishmaniasis Cutánea y mucocutánea, Provincia de Alto Amazonas 2020 – 2025.



Fuente: Notiweb-Individual

Elaborado: Área de Epidemiología-DIREDSA

La mayoría de casos corresponde a la etapa de vida Adulto (30-59 años) con 45% (9 casos), seguido de niños (0-11 años) con 5% (1 casos), Adulto joven (18 - 29 años) con 30% (6 casos), Adulto Mayor (>60) con 5% (1 caso), y adolescentes (12 -17 años) con el 15% (3 casos). (Figura N°8). Se observa que la leishmaniasis cutánea es la más y la tendencia indica una disminución progresivamente hasta el 2025 lo que indica una reducción en la afectación poblacional. (Figura 09).

1.4.- MAYARO (A92.8)


La Fiebre de Mayaro está producida por el virus Mayaro (MAYV) que es un virus emergente transmitido por mosquitos que produce brotes de fiebre y artralgias. El virus pertenece a la familia *Togaviridiae* y al género *Alphavirus*. MAYV se transmite por mosquitos del género Aedes y tiene una repercusión importante en la salud pública de las Américas. Hasta la S.E 22 tenemos un acumulado de 01 caso con una tasa de incidencia (TIA) 0.01 x 1000 habitantes, se debe continuar con la vigilancia epidemiológica en todos los distritos de la Provincia.

Tabla N°05. Casos de Mayaro por inicio de síntomas y distritos de la Provincia de Alto Amazonas, 2024- 2025*

Distritos/ Años	POB 2025	2024			2025		
		Casos	F	TIA	Casos	F	TIA
Balsapuerto	25836	1	0	0.05	0	0	0.00
Jeberos	6897	1	0	0.18	0	0	0.00
Lagunas	15117	4	0	0.27	0	0	0.00
Santa Cruz	5383	0	0	0.00	0	0	0.00
Teniente Cesar López. R.	7064	0	0	0.00	0	0	0.00
Yurimaguas	102474	32	0	0.41	1	0	0.01
Total provincial	162771	38	0	0.30	1	0	0.01

Fuente: NotiWeb-Individual


Elaborado: Área de Epidemiología-DIREDSA

Figura N°10. Casos de Mayaro, Provincia de Alto Amazonas 2024-2025.

Fuente: NotiWeb-Individual

Elaborado: Área de Epidemiología-DIREDSA

En lo que va al 2025, la tendencia de casos de Mayaro, disminuyó a comparación del año anterior.

Figura N° 11. Casos de Mayaro por grupo de edades Provincia de Alto Amazonas 2025.

Fuente: NotiWeb-Individual

Elaborado: Área de Epidemiología-DIREDSA

La mayoría de casos corresponde a la etapa Adulto Mayor (>60) con 100% (01 casos), etapa de vida Adulto (30-59 años) con 0% (0 casos), seguido de Adulto joven (18 - 29 años) con 0% (0 caso), seguido de niños (0-11 años) con 0% (0 casos), y adolescentes (12 -17 años) con el 0% (0 casos). (Figura N°11).

II. ENFERMEDADES ZOÓNOTICAS

2.1.- LEPTOSPIROSIS (A27)

La Leptospirosis es una enfermedad Zoonótica causada por la bacteria Leptospira interrogans, que es patógena para los hombres y los animales, con más de 200 variedades serológicas o serovariiedades. La leptospirosis puede presentarse con una amplia variedad de manifestaciones clínicas, desde una forma leve a una enfermedad grave y a veces fatal. Tiene potencial epidémico, generalmente después de lluvias intensas. Sus síntomas pueden parecerse a varias enfermedades, como influenza, dengue y otras enfermedades hemorrágicas de origen viral; es importante el diagnóstico correcto (clínico y de laboratorio) al inicio de los síntomas para evitar casos graves y salvar vidas principalmente en situaciones de brotes, en la S.E. N° 22 no se notificó casos de Leptospirosis, con un Acumulado de 485 casos con una tasa de incidencia (TIA) 2.97×1000 habitantes. Los casos de leptospirosis de incremento en la mayoría de distritos y estos datos resaltan la importancia de la vigilancia epidemiológica y posibles medidas de control en los distritos con mayor incremento.

Boletín Epidemiológico

Año 2025 SE 22

Dirección de Red de Salud Alto Amazonas

25 al 31 de Mayo.


Tabla N°06. Casos de Leptospirosis por inicio de síntomas y distritos de la Provincia de Alto Amazonas, 2024- 2025*

Distritos	2024				2025				Variaciones 2024 - 2025	Comportamiento del año 2025 en relación al 2024
	S.E. Nº 22	Acumulado S.E. Nº 22	TIA(1000 hab.)	Defunciones	S.E. Nº 22	Acumulado S.E. Nº 22	TIA(1000 hab.)	Defunciones		
Balsapuerto	0	1	0.05	0	0	13	0.50	0	12	INCREMENTO
Jeberos	0	0	0.00	0	0	4	0.58	0	4	INCREMENTO
Lagunas	0	0	0.00	0	0	65	4.28	0	65	INCREMENTO
Santa Cruz	1	1	0.22	0	0	5	0.93	0	4	INCREMENTO
Tnt. Cesar Lopez Rojas	0	0	0.00	0	0	26	3.68	0	26	INCREMENTO
Yurimaguas	21	97	1.27	0	0	372	3.62	0	275	INCREMENTO
Provincia de Alto Amazonas	22	99	0.79	0	0	485	2.97	0	-12	DISMINUCIÓN

Fuente: Notiweb-Individual

Elaborado: Área de Epidemiología-DIREDSAA

Figura N° 12. Tendencia Semanal de Casos de Leptospirosis, Provincia de Alto Amazonas 2022-2025.




Fuente: Notiweb-Individual

Elaborado: Área de Epidemiología-DIREDSAA

En 2022 y 2023, los casos de leptospirosis se mantuvieron en niveles bajos con pocos picos de aumento. En 2024, hubo un incremento significativo en el número de casos, con un gran aumento en la segunda mitad del año. El año 2025 en lo que va hasta la S. E. 22, la tendencia de los casos continúa siendo elevados. Esto indica un aumento preocupante en la incidencia de leptospirosis en los últimos años, posiblemente relacionados con factores ambientales, climáticos o de salud pública.

Figura N° 13. Casos de Leptospirosis por grupo de edades Provincia de Alto Amazonas 2025.



La mayoría de casos corresponde a la etapa de vida niño-niña (0-11 años) con 24% (118 casos) seguido por etapa de vida Adulto (30-59 años) con 32% (157 casos), Adulto joven (18 - 29 años) con 19% (90 casos), Adolescentes (12 - 17 años) con el 19% (90 casos) y Adulto Mayor (>60) con 6% (30 casos). Esto sugiere que los niños y adultos son los grupos más afectados, posiblemente debido a factores de exposición ambiental o laborales.

Fuente: Notiweb-Individual

Elaborado: Área de Epidemiología-DIREDSAA

2.1.- OFIDISMO (X20)

Es el síndrome causado por la inoculación de sustancias venenosas de alguna de las serpientes venenosas. Existen unas tres mil especies de serpientes en el mundo, de ellas al menos el 10% son venenosas para el ser humano. Las familias de serpientes consideradas venenosas son cinco: Viperidae, Elapidae, Hydrophidae, Atractaspidae y Colubridae. En el Perú, los nombres de las serpientes están en relación con las aéreas geográficas y cada una adopta un nombre diferente, así tenemos: el género Lachesis (shushupe) se encuentra solo en la selva, el género Crotalus (cascabel) se encuentra en Sandia (Puno) y Tambopata (Madre de Dios), los géneros Bothrops (jergón) y Micrurus (corales) se encuentran en la costa, sierra y selva. Este daño es constante en nuestra Provincia sobre todo en épocas de lluvia por eso el personal de salud debe estar capacitado para tomar en forma rápida medidas de acción que no pongan en riesgo la vida del paciente.

En la semana epidemiológica N° 22 se reportó casos de ofidismo, con un Acumulado de 52 casos con una tasa de incidencia acumulada (IA) 0.41 por 1000 habitantes.

Tabla N° 07. Casos de Ofidismo por inicio de síntomas y distritos de la Provincia de Alto Amazonas, 2024- 2025.

Distritos	2024				2025				Variación 2024- 2025	Comportamiento del año 2025 en relación al 2024
	22	Acumulado S.E. N° 22	TIA(1000 hab.)	Defunciones	22	Acumulado S.E. N° 22	TIA(1000 hab.)	Defunciones		
Balsapuerto	0	5	0.27	0	0	9	0.49	0	4	INCREMENTO
Jeberos	0	4	0.74	0	0	9	1.66	0	5	INCREMENTO
Lagunas	1	10	0.68	0	0	3	0.20	0	-7	DISMINUCIÓN
Santa Cruz	0	2	0.44	0	0	4	0.88	0	2	INCREMENTO
Tnt, Cesar Lopez Rojas	0	7	1.01	1	0	8	1.15	0	1	INCREMENTO
Yurimaguas	1	21	0.27	0	0	19	0.25	0	-2	DISMINUCIÓN
Provincia de Alto Amazonas	2	49	0.38	1	0	52	0.41	0	3	INCREMENTO

Fuente: Notiweb-Individual

Elaborado: Área de Epidemiología-DIREDSAA

**figura N° 14. Tendencia de Casos de Ofidismo,
Provincia de Alto Amazonas 2025**





Figura N° 15. Casos de Ofidismo por grupo De edad, Provincia de Alto Amazonas 2025.



Fuente: Notiweb-Individual

Elaborado: Área de Epidemiología-DIREDSA

La mayoría de los casos corresponde a la etapa adulto (30 - 59 años) con 36% (19 casos), seguido con la etapa de Adolescentes (12 -17 años) con 27% (14 casos), etapa de vida Adulto Joven (18-29 años) con 23% (12 casos), Adulto Mayor (>60) con 8% (04 casos), y etapa de vida niño-niños (0-11 años) con 6% (3 casos).

2.3 LOXOSCELISMO(X21)

El loxoscelismo es un problema de salud pública ocasionado por la mordedura de la especie *Loxosceles laeta*, que se encuentra, principalmente, en zonas urbanas y suburbanas. Los accidentes loxoscélicos ocurren en su mayoría entre el periodo de primavera y verano, las zonas del cuerpo más frecuentemente afectadas son el muslo, el tronco y la parte proximal de los brazos, y afecta, principalmente, a mujeres, en zonas urbanas, urbano-marginales y dentro del hogar.

Hasta la semana N° 22 se reporta 12 casos de Loxoscelismo con un TIA de 0.09 x 1000 hab.


Tabla N° 08. Casos de Loxoscelismo por inicio de síntomas y distritos de la Provincia de Alto Amazonas, 2024-2025.

Distritos	2024				2025				Variacion 2024- 2025	Comportamiento del año 2025 en relación al 2024
	22	Acumulado S.E. N° 22	TIA(1000 hab.)	Defunciones	22	Acumulado S.E. N° 22	TIA(1000 hab.)	Defunciones		
Balsapuerto	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	SIN VARIACIÓN
Jeberos	0	0	0.00	0	0	1	0.18	0	1	INCREMENTO
Lagunas	0	1	0.07	0	0	2	0.14	0	1	INCREMENTO
Santa Cruz	0	1	0.22	0	0	0	0.00	0	-1	DISMINUCIÓN
Tnt, Cesar Lopez Rojas	0	0	0.00	0	1	2	0.29	0	2	INCREMENTO
Yurimaguas	0	1	0.01	0	0	7	0.09	0	6	INCREMENTO
Provincia de Alto Amazon	0	3	0.02	0	1	12	0.09	0	9	INCREMENTO

Fuente: Notiweb-Individual

Elaborado: Área de Epidemiología-DIREDSA

Figura N° 16. Casos de Loxoscelismo por grupos de edad 2025.




Fuente: Notiweb-Individual

Elaborado: Área de Epidemiología-DIREDSA

El grupo de edad más afectado es la etapa Adulto (30-59 años) con 25% (3 casos), adulto joven (18-29 años) con 50% (6 casos), etapa Adolescentes (12-17 años) con 17% (2 casos), adulto mayor (+60 años) con 8% (1 caso) y la etapa de vida niño(a) con 0% (02 caso). (fig. 16).

Figura N° 17. Casos de Loxoscelismo en la Provincia de Alto Amazonas 2020-2025.



Fuente: Notiweb-Individual

Elaborado: Área de Epidemiología-DIREDSA

Los casos en 2020-2023 se mantuvieron relativamente estable, con fluctuaciones menores entre 5 y 7 casos; en 2025 hasta la semana 22 solo se han reportado 12 casos lo que parece indicar una disminución en comparación con 2024. Sin embargo, este número podría aumentar a lo largo del año. (fig. 17).

III.- OTRAS ENFERMEDADES SUJETAS A VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

3.1.- ENFERMEDAD DIARREICA AGUDAS.

3.1.1. ENFERMEDAD DIARREICA AGUDAS ACUOSAS

Las EDAs clasificadas como diarrea aguda acuosa, se define por presentar aumento en frecuencia (3 o más veces en 24 horas), fluidez y/o volumen de las deposiciones en comparación a lo habitual, con pérdida variable de agua y electrolitos y cuya duración es menor de 14 días.

En la SE N° 22 de este año, se notifica 137 con un acumulado de 3290 casos de EDA acuosa TIA 20.21 X 1000, hab. con un 10 % de incremento a comparación del año 2024. (Tabla N°09)

Los incrementos de las EDAs se presentaron en los distritos de Jeberos, Lagunas, Santa Cruz, Tnte. Cesar Lopez Rojas y Yurimaguas. Es crucial reforzar la vigilancia y las acciones preventivas para reducir la incidencia ya que en estas épocas hay temporadas de lluvias en la selva, ocasionando desbordes de los ríos que vienen afectando a las comunidades por consiguiente afectando a su consumo de agua de la población.


Tabla N° 09. Casos de enfermedad diarreica acuosa en la Provincia de Alto Amazonas, 2024 – 2025.

Distritos	Semanas epidemiológicas SE. N° 22										Variación 2024 - 2025	Comportamiento del año 2025 en relación al 2024		
	2024					2025								
	Nº Episodios SE. 22	Nº Episodios Acumulado	TIA (1000 Hab)	Defunciones SE. 22	Defunciones Acumulado	Nº Episodios SE. 22	Nº Episodios Acumulado	TIA (1000 Hab)	Defunciones SE. 22	Defunciones Acumulado				
Balsapuerto	22	581	31.76	0	0	18	491	19.00	0	0	-90	DISMINUCIÓN		
Jeberos	2	123	22.72	0	0	2	140	20.30	0	0	17	INCREMENTO		
Lagunas	4	378	69.82	0	6	8	387	25.60	0	0	9	INCREMENTO		
Santa Cruz	0	97	21.34	0	0	12	236	43.84	0	0	139	INCREMENTO		
Tnte. Cesar López Rojas	2	166	23.93	0	0	8	233	32.98	0	0	67	INCREMENTO		
Yurimaguas	65	1639	21.18	0	0	89	1803	17.59	0	0	164	INCREMENTO		
Total Alto Amazonas	95	2984	23.45	0	6	137	3290	20.21	0	0	306	INCREMENTO		

Fuente: Notiweb-EDA


Elaborado: Área de Epidemiología-DIREDSA

Figura N° 18. Episodios de diarreicas agudas acuosas por grupos de edad, 2025.



Fuente: NotiWeb. - EDA
Elaborado: Área de Epidemiología-DIREDSA


Figura N° 19. Tendencia de episodios de EDAA, Provincia de Alto Amazonas 2022 – 2025.



Fuente: NotiWeb-EDA
Elaborado: Área de Epidemiología-DIREDSA

Los Episodios de enfermedades diarreas agudas (EDAs), a la S.E. 22, con mayores casos presentados fueron en el grupo de edad de 5 a más años haciendo 52% con (1705 casos), luego los menores de 1 a 4 años con 38% (1255 casos), y con menor casos en los menores de 1 año con 10% (330 casos). (Figura N°18). La tendencia de los casos de diarrea acuosa en 2022 y 2023 presentan una variabilidad moderada, con unas fluctuaciones en el número de casos en 2024 se nota un incremento significativo, con picos más alto en comparación de años anteriores y en este año 2025 hasta la semana 22 nos muestra una leve disminución (fig.19).

Figura N°20. Canal endémico de episodios de EDAA, Provincia de Alto Amazonas, 2025.



Fuente: Epidemiología _ DIREDSA

El canal endémico de episodios de EDA acuosa en la Provincia de Alto Amazonas nos muestra un incremento en relación con la última semana y se encuentra en **ZONA DE EPIDEMIA**, lo que podría estar relacionado con factores climáticos, calidad del agua o problemas de saneamiento. (Figura N°20).

3.1.2. ENFERMEDAD DIARREICA AGUDAS DISENTÉRICAS.

Diarrea aguda disentérica, se presenta aumento en frecuencia y fluidez de las deposiciones, de volumen escaso o moderado y que además evidencia en las heces sangre visible y moco comúnmente causada por infecciones bacterianas como shigella o entamoeba histolytica.

En la S.E 22 EDA disentérica se presentaron 06 casos, con un acumulado de 59 casos de EDA disentéricas TIA 0.36 X 1000 hab. en general encontramos una disminución en comparación al año 2024. Se debe mantener las medidas preventivas para evitar brotes.

Boletín Epidemiológico

Año 2025 SE 22

Dirección de Red de Salud Alto Amazonas

25 al 31 de Mayo.


Tabla N° 10. Casos de enfermedad diarreica disentérica, 2024 – 2025.

Distritos	Semanas epidemiológicas SE N° 22										Variación 2024 - 2025	Comportamiento del año 2025 en relación al 2024		
	2024					2025								
	Episodios SE 22	Episodios Acumulado	TIA (1000 Hab)	Defunciones SE. 22	Defunciones Acumulado	Episodios SE 22	Episodios Acumulado	TIA (1000 Hab)	Defunciones SE. 22	Defunciones Acumulado				
Balsapuerto	1	11	0.60	0	0	1	20	0.77	0	0	9	INCREMENTO		
Jeberos	0	2	0.37	0	1	0	1	0.14	0	0	-1	DISMINUCIÓN		
Lagunas	0	5	0.92	0	1	1	14	0.93	0	0	9	INCREMENTO		
Santa Cruz	0	9	1.98	0	0	1	3	0.56	0	0	-6	DISMINUCIÓN		
Tnte. Cesar López Rojas	0	0	0.00	0	0	1	1	0.14	0	0	1	INCREMENTO		
Yurimaguas	2	15	0.19	0	0	2	20	0.20	0	1	5	INCREMENTO		
Total Alto Amazonas	3	42	0.33	0	2	6	59	0.36	0	1	17	INCREMENTO		

Fuente: NotiWeb-EDA

Elaborado: Área de Epidemiología-DIREDSA


Figura N°21. Episodios de enfermedades diarreicas disentéricas por grupos de edad en la Provincia de Alto Amazonas, 2025.



Fuente: NotiWeb-EDA

Elaborado: Área de Epidemiología *Hasta S.E. N°22

Figura N° 22. Porcentaje de episodios de EDAS acuosas y disentéricas por distritos, Provincia de Alto Amazonas, 2025.




Fuente: NotiWeb- EDA

Elaborado: Área de Epidemiología*Hasta S.E. N°22

Los Episodios de enfermedades diarreas agudas disentéricas, hasta la S.E. 22 se presentaron en la etapa de vida de 5 a más años con el 56% con (33 casos), 1-4 años con 36% (21 casos) y <1 año con 8% (05 casos). (Fig. N°21).

Figura N° 23. Canal endémico de episodios de EDA disentéricas, provincia de Alto Amazonas, 2025.



Fuente: NotiWeb-EDA

Elaborado: Área de Epidemiología _ DIREDSA

El canal endémico de episodios de EDA Disentéricas en la provincia de Alto Amazonas nos muestra un incremento en relación a la última semana y se encuentra en **ZONA DE EPIDEMIA**.

3.2.1 INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS (IRA)

Las Infecciones Respiratoria agudas son enfermedades del tracto respiratorio que pueden afectar desde la nariz y garganta (vías respiratorias superiores) hasta los pulmones (vías respiratorias inferiores). Estas infecciones pueden ser causantes por virus o bacterias y se transmiten principalmente por contacto con secreciones o superficies contaminadas. En la Provincia de Alto Amazonas en la S.E. 22 se han notificado 305 episodios de IRA en menores de 5 años, con un acumulado de 6849 casos lo que representa una incidencia acumulada (IA) de 346.54% por cada 1000 menores de 5 años.


Tabla N° 11. Casos de infecciones respiratorias agudas en la Provincia de Alto Amazona, 2024 –2025

Distritos	Semanas epidemiológicas SE N° 22						Variación 2024 - 2025	Comportamiento del año 2025 en relación al 2024		
	2024			2025						
	Nº Episodios SE 22	Acumulado	TIA (1000 Hab)	Nº Episodios SE 22	Acumulado	TIA (1000 Hab)				
Balsapuerto	50	1116	512.16	59	1189	270.72	73	INCREMENTO		
Jeberos	8	469	727.13	15	489	420.10	20	INCREMENTO		
Lagunas	17	733	419.34	20	865	556.27	132	INCREMENTO		
Santa Cruz	1	223	412.20	11	496	674.83	273	INCREMENTO		
Tnte. Cesar López Rojas	19	342	414.04	14	357	458.28	15	INCREMENTO		
Yurimaguas	196	3927	426.20	186	3453	309.99	-474	DISMINUCIÓN		
Total Alto Amazonas	291	6810	449.42	305	6849	346.54	39	INCREMENTO		

Fuente: NotiWeb-IRA

Elaborado: Área de Epidemiología-DIREDSAA


Figura N° 24. Episodios de Infecciones Respiratorias Agudas por grupos de edad en la Provincia de Alto Amazonas, 2025.



Fuente: NotiWeb-IRA

Elaborado: Área de Epidemiología *Hasta S.E. N°22

Figura N° 25. Canal endémico de episodios de IRAS en menores de 5 años en la Provincia de Alto Amazonas 2025.



Fuente: NotiWeb-IRA

Elaborado: Área de Epidemiología *Hasta S.E. N°22

La etapa de vida afectadas es (1 a 4 años), con el 72% (4947 casos), seguido (2-11 meses) con el 25% (1695 casos) y la etapa con menor casos (<2 meses), con 3% (207 casos), (fig. 24); en las primeras semanas epidemiológicas del año, los casos se encuentran en la zona de alarma y epidemia. En esta semana se encuentra en **ZONA DE ALARMA** se recomienda fortalecer medidas preventivas, como vacunación, promoción de higiene respiratoria y estrategias de reducción de contagios en poblaciones vulnerables. (fig. 25).

3.2.2 NEUMONIA EN MENORES DE 05 AÑOS.

Es una infección respiratoria que afecta a los pulmones y es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en este grupo etario. Se caracteriza por inflamación y acumulación de líquido en los alvéolos lo que dificulta la respiración. Hasta la S.E. 22 del presente año se notificaron 117 episodios de neumonía, lo que representa una incidencia acumulada (IA) de 5.92 por cada 1000 menores de 5 años. La tasa y el número de episodios de neumonías, en lo que va del año, se presenta una disminución de 21% (32 casos) con respecto del mismo periodo del año 2024. El distrito de Yurimaguas presenta la tasa de incidencia elevada de 7.45 por 1000 menores de 5 años.


Tabla N°12. Casos de Neumonía en menores de 5 años en la Provincia de Alto Amazonas, 2024-2025.

Distritos	Semanas epidemiológicas SE N° 22									Variación 2024 - 2025	Comportamiento del año 2025 en relación al 2024	
	2024				2025							
	Nº Episodios SE 22	Acumulado	TIA (1000 Hab)	Defunciones SE. 22	Defunciones Acumulado	Nº Episodios SE 22	Acumulado	TIA (1000 Hab)	Defunciones SE. 22	Defunciones Acumulado		
Balsapuerto	2	36	16.52	0	0	1	3	0.68	0	0	-33	DISMINUCIÓN
Jeberos	0	0	0.00	0	0	0	1	0.86	0	0	1	INCREMENTO
Lagunas	3	16	9.15	0	1	1	19	12.22	0	0	3	INCREMENTO
Santa Cruz	0	3	5.55	0	0	2	7	9.52	0	0	4	INCREMENTO
Tnte. Cesar López Rojas	1	2	2.42	0	1	0	4	5.13	0	0	2	INCREMENTO
Yurimaguas	5	92	9.98	0	1	5	83	7.45	0	0	-9	DISMINUCIÓN
Total Alto Amazonas	11	149	9.83	0	3	9	117	5.92	0	0	-32	DISMINUCIÓN

Fuente: NotiWeb-IRA

Elaborado: Área de Epidemiología-DIREDSAA


Figura N° 26. Grupos de edad afectados por Neumonías en menores de 5 años en la Provincia de Alto Amazonas, 2025.



Fuente: NotiWeb-IRA

Elaborado: Área de Epidemiología *Hasta S.E. N° 22

Figura N° 27. Canal endémico de episodios de Neumonía en menores de 5 años en la Provincia de Alto Amazonas, 2025.



Fuente: NotiWeb-IRA

Elaborado: Área de Epidemiología *Hasta S.E. N° 22

La mayoría de los casos afectados por Neumonías corresponde a niños de los niños de (1 - 4 años) con 69% (81 casos) seguido de (2-11 meses) con 29% (34 casos), y niños (<2 meses) con 2% (2 casos). (fig. 26). Se debe continuar con la vigilancia de dicho daño ya que los menores de 05 años es el grupo más vulnerable. El canal endémico provincial de Neumonías en la provincia de Alto Amazonas nos muestra un aumento en relación a la última semana y se encuentra en **Zona de Epidemia**. (fig. 27).

3.2.3 SINDROME OBSTRUCTIVO BRONQUIAL AGUDO (SOB/ASMA).

Es un conjunto de signos y síntomas caracterizado por la obstrucción transitoria y reversible del flujo aéreo en los bronquios, generalmente debido a la inflamación, espasmo del músculo liso bronquial y aumento de secreciones. Se manifiesta con sibilancias, disnea, tos y dificultad respiratoria. En la semana S.E. 22 no se presentaron casos, con un acumulado de 100 casos con una tasa de incidencia acumulada de 4.95 x cada 1000 menores de 5 años, siendo Yurimaguas el distrito donde se presentan más casos.

El número de episodios de SOB/ASMA en lo que va del año, presenta un Incremento de 16.2% (14) los casos a lo reportado en el mismo periodo del año 2024.

Tabla N° 13. Casos de SOBA en menores de 5 años, 2024-2025.

Distritos	Semanas epidemiológicas SE N° 22						Variación 2024 - 2025	Comportamiento del año 2025 en relación al 2024		
	2024			2025						
	Nº Episodios SE 22	Acumulado	TIA (1000 Hab)	Nº Episodios SE 22	Acumulado	TIA (1000 Hab)				
Balsapuerto	0	7	3.21	0	0	0.00	-7	DISMINUCIÓN		
Jeberos	0	0	0.00	0	0	0.00	0	SIN VARIACIÓN		
Lagunas	1	4	2.29	0	1	0.61	-3	DISMINUCIÓN		
Santa Cruz	0	1	1.85	0	0	0.00	-1	DISMINUCIÓN		
Tnte. Cesar López Rojas	1	1	1.21	0	1	1.28	0	SIN VARIACIÓN		
Yurimaguas	11	73	7.92	0	98	8.52	25	INCREMENTO		
Total Alto Amazonas	13	86	5.68	0	100	4.95	14	INCREMENTO		

Fuente: NotiWeb-IRA

Elaborado: Área de Epidemiología-DIREDSAA

Figura N° 28. Episodios de SOB/ASMA por grupos de edad en la Provincia de Alto Amazonas, 2025.




Fuente: NotiWeb-IRA

Elaborado: Área de Epidemiología *Hasta S.E. N° 22

La mayoría de casos presentados corresponden al grupo de edad de < 2 meses con 79% (80 casos) y 2-4 años con 21% (21 casos).

Figura N° 29. Canal endémico de episodios de SOB/ASMA en la Provincia de Alto Amazonas, 2025.



Fuente: NotiWeb-IRA

Elaborado: Área de Epidemiología*Hasta S.E. N° 22

Según el canal endémico provincial nos encontramos en **ZONA DE ALARMA** en esta semana del año. Es importante el monitoreo para prevenir brotes y tomar medidas oportunas en caso de aumento de casos.

3.3 TOS FERINA (A37)

La Tos ferina (también conocida como Pertussis), es una enfermedad respiratoria altamente contagiosa causada por la bacteria Bordetella Pertusis. Afecta principalmente a los niños.

Hasta la SE N° 22 de este año, se notifica 03 casos probables de Tos ferina, con una incidencia acumulada TIA 0.02 X 1000 hab. (Tabla N° 14).


Tabla N°14. Casos de Tos ferina, 2024-2025.

Años Distritos / Tipo de DX	Población 2025	2024						2025					
		C	D	P	F	T	TIA	C	D	P	F	T	TIA
Balsapuerto	25836	0	0	0	0	0	0.00	0	0	1	0	1	0.04
Jeberos	6897	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00
Lagunas	15117	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00
Santa Cruz	5383	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00
Teniente Cesar López. R.	7064	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00
Yurimaguas	102474	0	0	0	0	0	0.00	0	0	2	0	2	0.02
Total provincial	162771	0	0	0	0	0	0.00	0	0	3	0	3	0.02

Fuente: NotiWeb-Individual

Elaborado: Área de Epidemiología-DIREDSAA


Figura N° 30. Casos de Tos ferina por grupos de edad en la Provincia de Alto Amazonas, 2025.



Fuente: NotiWeb-Individual

Elaborado: Área de Epidemiología-DIREDSAA

Figura N° 31. Casos de Tos ferina, en la Provincia de Alto Amazonas, 2021- 2025.



Fuente: NotiWeb-Individual

Elaborado: Área de Epidemiología-DIREDSAA

La mayoría de los casos corresponden a la etapa de vida niño (0-11 años) con 100% (3 casos), seguido adulto joven (18 -29 años) con el 0% (0 casos), etapa adolescente (12-17 años) con 0% (0 casos) y etapa adulta (30-59 años) con 0% (0 casos) (Figura N° 30). Durante cuatro años consecutivos (2021-2024) no se reportaron casos de Tosferina en la provincia. En el 2025 se notificaron 3 casos, lo cual representa un alza significativa, evidenciándose un inicio de un brote tras años sin casos. (fig 31).

3.4 VARICELA (B019)

La varicela es una enfermedad causada por el virus de la varicela-zóster. Causa un sarpullido con picazón y pequeñas ampollas con líquido. La varicela se contagia muy fácil a personas que no han tenido la enfermedad antes o no se han vacunado. Solía ser un problema generalizado, pero, en la actualidad, la vacuna protege a los niños de contraerla.

Hasta la SE N° 22 de este año, se notifica casos 15 casos de varicela sin complicación, con una incidencia acumulada TIA 0.09 X 1000 hab. (Tabla N° 15).


Tabla N°15. Casos de Varicela, 2024-2025.

Años Clasificación Distritos/ Tipos de Dx	Pob.2025	2024				2025			
		Vcc	Vsc	T	IA	Vcc	Vsc	T	IA
Balsapuerto	25836	0	26	26	1.42	0	7	7	0.27
Jeberos	6897	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
Lagunas	15117	0	11	11	0.75	0	0	0	0.00
Santa Cruz	5383	0	3	3	0.66	0	1	1	0.19
Teniente Cesar López. R.	7064	0	2	2	0.29	0	0	0	0.00
Yurimguas	102474	0	70	68	0.88	0	7	0	0.00
Total provincial	162771	0	112	112	0.88	0	15	15	0.09

Fuente: NotiWeb-Individual

Elaborado: Área de Epidemiología-DIREDSA


Figura N° 32. Casos de Varicela por grupos de edad en la Provincia de Alto Amazonas, 2025.



Fuente: NotiWeb-Individual

Elaborado: Área de Epidemiología-DIREDSA

Figura N° 33. Casos de Varicela, en la Provincia de Alto Amazonas, 2017- 2025.



Fuente: NotiWeb-Individual

Elaborado: Área de Epidemiología-DIREDSA

La mayoría de los casos corresponden a la etapa de vida niño (0-11 años) con 73% (11 casos), seguido adulto joven (18 -29 años) con el 7% (1 caso), etapa adolescente (12-17 años) con 13% (02 casos) y etapa adulta (30-59 años) con 7% (1 caso) (Figura N° 32).

3.5 SÍFILIS (A58)

Sífilis es un problema de salud pública importante a nivel mundial. Es una infección bacteriana causada por **Treponema pallidum** que da lugar a una morbilidad y mortalidad sustanciales. Se trata de una infección de transmisión sexual (ITS) que generalmente se transmite por el contacto con úlceras infecciosas presentes en los genitales, el ano, el recto, los labios o la boca; por medio de las transfusiones de sangre, o mediante la transmisión materna infantil durante el embarazo.

3.5.2 SÍFILIS NO ESPECIFICADA (A51).

La sífilis es una infección sistémica producida por el Treponema Pallidum, se transmite por vía sexual, tanto por sexo oral, vaginal o anal, con una infectividad de alrededor del 30%. En este año 2025 la Provincia de Alto Amazonas hasta la S.E. N° 22, se notificaron 20 casos de Sífilis no Especificada con una tasa de incidencia acumulada (IA) 0.14 X 1000 hab.


Tabla N° 16. Casos de Sífilis no especificada, 2024-2025.

Distritos/ Años	POB > 12 + años 2025	2024			2025		
		Casos	F	TIA	Casos	F	TIA
Balsapuerto	21466	0	0	0.00	1	0	0.05
Jeberos	5976	4	0	1.03	0	0	0.00
Lagunas	13573	1	0	0.10	2	0	0.15
Santa Cruz	4820	0	0	0.00	0	0	0.00
Teniente Cesar López. R.	6426	2	0	0.40	0	0	0.00
Yurimaguas	91340	44	0	0.80	17	0	0.19
Total provincial	143601	51	0	0.56	20	0	0.14

Fuente: NotiWeb-Individual

Elaborado: Área de Epidemiología-DIREDSA


Figura N° 34. Casos de Sífilis no Especificada por grupos de edad en la Provincia de Alto Amazonas, 2025.



Fuente: NotiWeb-Individual

Elaborado: Área de Epidemiología*Hasta S.E. N° 22

Figura N° 35. Casos de Sífilis no Especificada en la Provincia de Alto Amazonas, 2021- 2025.



Fuente: NotiWeb-Individual

Elaborado: Área de Epidemiología*Hasta S.E. N° 22

La mayoría de casos corresponde a la etapa de vida Adulto Joven (18-29 años) con 46% (8 casos), seguido del adulto (30 - 59 años) con 45% (9 casos), Adolescentes (12 -17 años) con el 10% (2 casos) y adulto Mayor (>60 años) con el 5% (1 caso), (fig. 34) se observa una disminución inicial en 2022, seguida de un repunte en 2023 y 2024. En 2025 hay una disminución de casos. Por lo que se insta a realizar actividades de promoción y prevención. (fig. 35).

3.6 HEPATITIS B. (B16)

Hepatitis. Son un grupo de enfermedades caracterizadas por producir inflamación del hígado. La infección por estos virus eleva las transaminasas y sólo en algunos casos aparecen síntomas. La **hepatitis B** se transmite por contacto con sangre (transfusiones, drogadicción) o vertical (de madre a hijo durante el embarazo o el parto). También se puede transmitir por contacto sexual. No suele producir síntomas y se puede volver crónica. La hepatitis B aguda se cura en un 90% de los casos, pero el 10% restante evoluciona hacia una hepatitis crónica.

Hasta la Semana Epidemiológica (SE) 22 - 2025, se notifica 10 casos de Hepatitis B a nivel provincial, reportándose una disminución de 11% (1) caso que el año 2024 en el mismo período. (Tabla N° 17).


Tabla N° 17. Casos de Hepatitis B, 2024-2025.

Años Distritos / Tipo de DX	Población 2025	2024						2025					
		C	D	P	F	T	TIA	C	D	P	F	T	TIA
Balsapuerto	25836	1	0	0	0	1	0.05	0	0	1	0	1	0.04
Jeberos	6897	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00
Lagunas	15117	1	0	2	0	3	0.20	0	0	0	0	0	0.00
Santa Cruz	5383	0	0	1	0	1	0.22	0	0	0	0	0	0.00
Teniente Cesar López. R.	7064	0	0	0	0	0	0.00	0	0	1	0	1	0.14
Yurimaguas	102474	0	0	4	0	3	0.04	0	0	8	0	5.4	0.05
Total provincial	162771	2	0	7	0	9	0.07	0	0	10	0	10	0.06

Fuente: NotiWeb-Individual

Elaborado: Área de Epidemiología*Hasta S.E. N° 22


Figura N° 36. Casos de Hepatitis B por grupos de edad en la Provincia de Alto Amazonas, 2025.



Fuente: NotiWeb-Individual

Elaborado: Área de Epidemiología*Hasta S.E. N° 22

Figura N° 37. casos de Hepatitis B, en la Provincia de Alto Amazonas, 2021- 2025.



Fuente: NotiWeb-Individual

Elaborado: Área de Epidemiología*Hasta S.E. N° 22


La mayoría de los casos corresponde a la etapa de vida adulto (30 -59años) con el 50% (5 casos), y etapa adolescente (12-17 años) con 20% (2 casos) y mayor de 60, con 30% (3 casos) adulto Joven (18-29 años) con 0% (0 casos) y etapa de vida niño-niña (0-11 años) con 0% (0 casos). Por lo que se insta a realizar actividades de promoción y prevención.

IV. VIGILANCIA DE DAÑOS NO TRANSMISIBLE

4.1 VIGILANCIA DE LESIONES DE ACCIDENTES DE TRANSITO

Es el que ocurre sobre la vía y se presenta súbita e inesperadamente, determinado por condiciones y actos irresponsables potencialmente previsibles, atribuidos a factores humanos, vehículos preponderantemente automotores, condiciones climatológicas, señalización y caminos, los cuales ocasionan pérdidas prematuras de vidas humanas y/o lesiones, así como secuelas físicas o psicológicas, perjuicios materiales y daños a terceros.


Figura N° 38. Casos de accidentes de tránsito atendidos por grupos de edad, en la Provincia de Alto Amazonas, 2025.



Fuente: Notiweb-Acctran
Elaborado: Epidemiología DRSAA

La mayoría de casos corresponden a la etapa de vida adulto (30-59 años) con 34%, seguido adulto joven (18 - 29 años) con el 37% y adolescentes (12-17) con el 15%, etapa vida niño-niña (0-11 años) con 9% y adulto mayor (>60 años) con 5%, (Figura N° 38).

Figura N° 39. Casos de accidentes de tránsito, Provincia de Alto Amazonas 2020- 2025.



Fuente: Notiweb-Acctran
Elaborado: Epidemiología DRSAA

Figura N° 40. Casos de Accidentes de Tránsito por lugar de Ocurrencia- 2025.


Calles y/o Avenidas	Casos	% Casos	Calles y/o Avenidas	Casos	% Casos
15 de Agosto	33	14.2	Grau	2	0.9
Libertad	24	10.3	AAHH San Juan	2	0.9
Vía de evitamiento	22	9.4	Maynas	2	0.9
Carretera Yqs-Tarapoto	21	9.0	28 de Julio	1	0.4
Las Americas	15	6.4	Jorge Chavez	1	0.4
Carretera Munichis	9	3.9	Jauregui	1	0.4
Zamora	7	3.0	Garcilazo	1	0.4
Jose Riera	7	3.0	Jose Galvez	1	0.4
Circunvalación carret.	6	2.6	Bolognesi	1	0.4
Iquitos	5	2.1	PPJJ 82	1	0.4
Alfonso Ugarte	5	2.1	Luis Ibarra	1	0.4
Tacna	5	2.1	Avacion	1	0.4
Victor Sifuentes	5	2.1	Progreso	1	0.4
Angamos	4	1.7	Carretera San Rafael	1	0.4
Comercio	3	1.3	Julio C Arana	1	0.4
Ucayali	3	1.3	Km. 21 Mariano Melgar	1	0.4
Km. 30 Santo Tomas	3	1.3	AAHH Independencia	1	0.4
Fco. Bardalez	3	1.3	Moto Cross	1	0.4
Mi Peru	3	1.3	(en blanco)	1	0.4
Arica	3	1.3	16 de Agosto	1	0.4
Aguirre	3	1.3	Munichis	1	0.4
Mcal. Castilla	3	1.3	AAHH LA Ramada	1	0.4
Condamine	3	1.3	San Martin	1	0.4
AAHH Violeta Correa	3	1.3	AAHH Filadelfia	1	0.4
AAHH Buena Vista	2	0.9	Total	233	100
Psjc. La Loma	2	0.9			
Mcal. Caceres	2	0.9			
AAHH Los Maderos	2	0.9			

Los casos de accidente de tránsito en este año 2025 hasta la S.E 22 hay 233 casos.

4.2. VIGILANCIA DE DIABETES

La diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce. La insulina es una hormona que regula el azúcar en la sangre. El efecto de la diabetes no controlada es la hiperglucemia (aumento del azúcar en la sangre), que con el tiempo daña gravemente muchos órganos y sistemas, especialmente los nervios y los vasos sanguíneos. Tipos de Diabetes tipo 1, Diabetes Tipo 2, Diabetes gestacional.


Figura N°41. Casos de Diabetes por grupos de edad, en la Provincia de Alto Amazonas,2025.



Fuente: Notiweb-Vig. Diabetes

Elaborado: Epidemiología DRSA

Figura N° 42. Casos de Diabetes, por Ipress, provincia de Alto Amazonas 2024-2025 (SEM 22).




Fuente: Notiweb-Diabetis- Área de Epidemiología DIREDSA

La mayoría de Los casos de diabetes corresponde al Hospital Santa Gema, seguido por Ipress Lagunas, Independencia, Pampa Hermosa,

La mayoría de casos corresponden a la etapa de vida adulto (30-59 años) con 63%, seguido del adulto mayor (>60 años) con 34%, adulto joven (18 -29 años) con el 3% y adolescentes (12-17) con el 2% (Figura N° 41).

Figura N° 43. Casos de Diabetes notificados vs seguimiento, por Ipress, Provincia de Alto Amazonas 2019-2025 (SEM 22).



Fuente: Notiweb -Diabetis-Área de Epidemiología-DIREDSA


Carretera, Jeberos, Balsapuerto, Santa María, Grau, Villa del Paranapura. Shucushyacu.

Figura N° 44. Casos de Diabetes, según tipo de Diabetes, Provincia de Alto Amazonas 2025 (sem 22).



Fuente: Notiweb-Diabetes-Área de Epidemiología-DIREDSA

Figura N° 45. Tipos de Diabetes según atención, Provincia de Alto Amazonas, año 2025 (Sem. 22).



Fuente: Notiweb-Diabetes-Área de Epidemiología-DIREDSA


La mayoría de Los casos de diabetes corresponde a Diabetes Tipo 2 con un 98%, Diabetes tipo 1 con un 2%, Diabetes Gestacional con 0% (Figura N° 44).

4.3. VIGILANCIA DE VIOLENCIA FAMILIAR

La violencia en la familia, principalmente, la cometida contra la mujer, y especialmente la ejercida por su pareja y la violencia sexual, constituye un grave problema de salud pública y una violación de los derechos humanos de las mujeres. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), se estiman que una de cada tres mujeres en el mundo sufre de violencia física y/o sexual de pareja o violencia sexual por terceros en algún momento de su vida. La mayoría de estos casos son violencia infligida por la pareja.


Hasta la S.E 22 la Provincia de Alto Amazonas presentan 132 casos notificados.

Figura N° 46. Casos de Violencia Familiar en la Provincia de Alto Amazonas, 2021 -2025 (SEM 22).



Fuente: Notiweb-viol. Fam.
Elaborado: Epidemiología DRSAA


Figura N° 47. Casos de Violencia Familiar, por Distritos, Provincia de Alto Amazonas. 2021-2025 (SEM. 22).



Fuente: Notiweb-viol. Fam.
Elaborado: Epidemiología DRSAA

La mayoría de Los casos de Violencia Familiar corresponde a la Micro Red de Yurimaguas, seguido de Lagunas, Balsapuerto, y Tnte. Cesar López. (Figura N° 47).


Figura N° 48. Casos de Violencia Familiar, por etapas de vida del agredido(o), Provincia de Alto Amazonas, 2025, (SEM. 22).



Fuente: Notiweb-viol. Fam.
Elaborado: Epidemiología DRSAA

La mayoría de casos corresponden a la etapa de vida adulto (30-59 años) con 45%, seguido del adulto mayor (>60 años) con 4%, adulto joven (18 -29 años) con el 36%, adolescentes (12-17) con el 10% y niño-niña (0-11 años) con 5%.


Figura N° 49. Tipos de Violencia Familiar, Provincia de Alto Amazonas 2025.



Fuente: Notiweb-viol. Fam.
Elaborado: Epidemiología DRSAA

La mayoría de Los casos de Violencia son Psicológica con 61%, seguido de violencia física con 32%, violencia sexual con 7% y abandono con 0% (Figura N° 49).

Figura N° 50. Violencia Familiar, según estado del agresor(a), Provincia de Alto Amazonas, año 2025.



Fuente: Notiweb-viol. Fam.
Elaborado: Epidemiología DRSAA


4.4 Vigilancia de Salud Mental

Se implica la promoción del bienestar, la prevención y el control de los problemas de salud mental, se ha implementado y se desarrolla la vigilancia de problemas de la salud mental priorizados en IPRESS centinela (Centro de Salud Mental Comunitario, Hospital Santa Gema II-2, Munichis, Aguamiro y Loma).

4.4.1 Intento de suicidio


El comportamiento suicida constituye un problema complejo, con múltiples causas interrelacionadas, siendo la enfermedad mental uno de los factores más importante que predispone al comportamiento suicida. Las personas afectadas por enfermedades mentales presentan un riesgo de suicidio diez veces mayor que aquellas personas que no las sufren. Los problemas mentales más a menudo asociados a los comportamientos suicidas son la depresión y los trastornos bipolares, el abuso de drogas y alcohol y la esquizofrenia. El suicidio es la muerte causada por un acto intencional de autolesión que está diseñado para ser mortal. El comportamiento suicida incluye suicidio consumado, intento de suicidio e ideación suicida. Hasta la S.E. 22 se notificaron 17 casos de intento de suicidio, en la Provincia de Alto Amazonas.

figura N°51. Casos de intento de Suicida en la Provincia de alto Amazonas, 2022-2025.




Fuente: Área de Epidemiología-DIREDSA

Figura N° 52. Casos de intentos de Suicidio por grupos de edad en la Provincia de Alto Amazonas, 2025.



Fuente: Área de Epidemiología*Hasta S.E. N°22

Figura N°53. Antecedentes de intento de suicida 2025.




Fuente: Área de Epidemiología*Hasta S.E. N°22

La mayoría de los casos corresponden a la etapa de vida adulto Joven (18-29 años) con 61%, etapa adulta (30-59 años) con 28% adolescentes (12-17) con 5%, adulto mayor (>60 años) con 6% y etapa niño (9-11 años) con 0%. (Figura N°52).

4.4.2 VIGILANCIA DEPRESIÓN MODERADA Y GRAVE.


Los trastornos depresivos se caracterizan por una tristeza de una intensidad o una duración suficiente como para interferir en la funcionalidad y, en ocasiones, por una disminución del interés o del placer despertado por las actividades. Se desconoce la causa exacta, pero probablemente tiene que ver con la herencia, cambios en las concentraciones de neurotransmisores, una alteración en la función neuroendocrina y factores psicosociales. El diagnóstico se basa en la anamnesis. En el tratamiento se utilizan fármacos, psicoterapia o ambos y en ocasiones terapia electroconvulsiva o estimulación magnética transcraneal rápida. Hasta la S.E. 22-2025 se notificaron 85 casos de depresión moderada y grave en este año, en la Provincia de Alto Amazonas.

Figura N°54. Casos de depresión moderada y grave, por IPRESS, provincia de Alto Amazonas, años 2021-2025.




Fuente: Área de Epidemiología-DIREDSA

Figura N° 55. Casos de Depresión por grupos de edad en la Provincia de Alto Amazonas, 2025.



Fuente: Área de Epidemiología*Hasta S.E. N°22

Figura N° 56. Casos de Depresión por Ipress, Provincia Alto Amazonas, 2023-2025.



Fuente: Unidad de Epidemiología*Hasta S.E. N°22

La mayoría de los casos corresponden a la etapa de vida adulto Joven (18-29 años) con 18%, adolescentes (12-17) con el 13%, etapa adulta (30-59 años) con 58%, adulto mayor (>60 años) con 10% y etapa niño (0-11 años) con 1%. (Figura N°55).

4.4.3 VIGILANCIA EPISODIO PSICÓTICO.

Los trastornos psicóticos son trastornos mentales graves que causan ideas y percepciones anormales. Las personas con psicosis pierden el contacto con la realidad. Dos de los síntomas principales son delirios y alucinaciones. Los delirios son falsas creencias, tales como la idea de que alguien está en su contra o que la televisión les envía mensajes secretos. Las alucinaciones son percepciones falsas, como escuchar, ver o sentir algo que no existe.


Hasta la S.E. 22 se notificaron 26 casos de episodio psicótico en este año, en la Provincia de Alto Amazonas.

Tabla N°18. Casos de episodio psicótico, por IPRESS, provincia de Alto Amazonas, años 2021-2025.

IPRESS	2021	2022	2023	2024	2025	Total
C.S.M.C YURIMAGUAS	5	9	19	20	1	54
LA LOMA	0	1	0	0	0	1
HOSPITAL SANTA GEMA	0	1	17	57	25	100
Total	5	11	36	77	26	155

Fuente: Área de Epidemiología-DIREDSAA

Figura N° 57. Casos de Episodio Psicótico por grupo etario en la Provincia de Alto Amazonas, 2025.



Fuente: Unidad de Epidemiología*Hasta S.E. N°22

La mayoría de casos corresponden al sexo Femenino con 65 % y sexo Masculino con 35% (Figura N°47).

Figura N° 58. Casos de Episodios Psicóticos por Meses, Provincia Alto Amazonas, 2021-2025.

Meses	2021	2022	2023	2024	2025	Total
Ene	0	0	0	3	8	11
Feb	0	2	1	5	7	15
Mar	0	2	3	5	4	14
Abr	0	0	3	6	4	13
May	0	1	3	2	3	9
Jun	0	1	1	20		22
Jul	0	2	3	13		18
Ago	4	2	5	6		17
Sep	1	0	4	0		5
Oct	0	1	8	3		12
Nov	0	0	0	2		2
Dic	0	0	5	12		17
Total	5	11	36	77	26	155

Fuente: Unidad de Epidemiología*Hasta S.E. N°22

4.4.4 VIGILANCIA POR INTOXICACIÓN POR PLAQUICIDAS


La implementación de esta vigilancia epidemiológica en el país, tiene como finalidad de contribuir en la prevención y control de la exposición e intoxicación por plaguicidas en la población del Perú. El objetivo es el de estandarizar la metodología de la vigilancia y establecer la oportunidad detección de situaciones de alerta y brotes y establecer mecanismos de articulación intersectorial para la vigilancia epidemiológica en salud pública del riesgo por exposición e intoxicación por plaguicidas. Hasta la S.E. 22 se notificaron 2 casos por intoxicación por plaguicidas en este año, en la Provincia de Alto Amazonas.

Tabla N°19. Casos de intoxicación por plaguicidas según IPRESS, provincia de Alto Amazonas, años 2024-2025.

IPRESS	2024	2025	%
Hospital Santa Gema	4	2	100.0
Pampa Hermosa	5	0	0.0
Providencia	1	0	0.0
Total	10	2	100

Fuente: Área de Epidemiología-DIREDSAA


Figura N° 59. Casos de intoxicación por plaguicidas, por grupo etáreo, provincia Alto Amazonas, año 2025.



Fuente: Unidad de Epidemiología*Hasta S.E. N°22

La mayoría de casos corresponden a la etapa de vida niño-niña (0-11 años) con 50%, seguido por la etapa adulto joven (18-29 años) con 50% adulto (30-59 años) con 0%, y etapa adulto mayor (60 a+) con 0% y etapa Adolescente (12-17 años) con 0% (Figura N°59).

Figura N° 60. Casos de intoxicación por plaguicidas según signos y síntomas, Provincia Alto Amazonas, 2025.



Fuente: Unidad de Epidemiología*Hasta S.E. N 22

V. MORTALIDAD POR TODAS LAS CAUSAS.

Las causas principales de defunción en el mundo, con arreglo al número total de vidas perdidas, se atribuyen a tres grandes cuestiones: las enfermedades cardiovasculares (cardiopatías isquémicas, accidentes cerebrovasculares), las enfermedades respiratorias (enfermedad pulmonar obstructiva crónica, infecciones de las vías respiratorias inferiores) y las afecciones neonatales, que engloban la asfixia y el traumatismo en el nacimiento, la septicemia e infecciones neonatales y las complicaciones del parto prematuro. Las causas de Mortalidad pueden agruparse en tres categorías: enfermedades transmisibles (enfermedades infecciosas y parasitarias y afecciones maternas, perinatales y nutricionales), enfermedades no transmisibles (crónicas) y lesiones.

Tabla N°20.Las principales causas de mortalidad en la Provincia de Alto Amazonas notificadas en la S.E (22) 2024-2025.

causas	Año		Total general
	2024	2025	
CIRROSIS HEPATICA	1		1
TUMOR MALIGNO DEL ESTOMAGO		1	1
ANEURISMA CEREBRAL		1	1
Total general	1	4	3

Fuente: Área de Epidemiología-DIREDSAA.

Tabla N°21. Las principales causas de mortalidad en la Provincia de Alto Amazonas notificadas en la S.E 22-2025.

Causas	Distritos	Total
	YURIMAGUAS	
TUMOR MALIGNO DEL ESTOMAGO	1	1
ANEURISMA CEREBRAL	1	1
ALTO AMAZONAS	2	2

Fuente: Área de Epidemiología-DIREDSAA

Boletín Epidemiológico

Año 2025 SE 22

Dirección de Red de Salud Alto Amazonas

25 al 31 de Mayo.

VI. Enfermedades/eventos sujetos a vigilancia epidemiológica, en la Provincia de Alto Amazonas, por SE 22, 2024 – 2025.

Enfermedades	2024			I.A(*)	2025			I.A(*)
	Semana 22	Acumulado	Defunción		Semana 22	Acumulado	Defunción	
Dengue con signos de alarma	1	142	0	1.12	4	163	0	1.00
Dengue grave	0	1	0	0.01	0	4	2	0.02
Dengue sin signos de alarma	53	1281	0	10.07	45	1374	0	8.44
Oropuche	2	12	0	0.09	0	9	0	0.06
Mayaro	1	36	0	0.28	0	0	0	0.00
Influenza AH1N1	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
Leptospirosis	22	99	1	0.78	0	485	0	2.98
Loxocelismo	0	3	0	0.02	1	12	0	0.07
Malaria P.Falciparum	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
Malaria P.Vivax	12	267	0	2.10	1	66	0	0.41
Muerte Materna Directa	0	1	1	0.01	0	0	0	0.00
Ofidismo	2	49	1	0.39	0	52	0	0.32
Sífilis Congenita	0	2	0	0.02	0	0	0	0.00
Sífilis Materna	0	18	0	0.14	0	9	0	0.06
Sífilis no especificada	0	31	0	0.24	1	20	0	0.12
Infección Gonococica	0	1	0	0.01	0	1	0	0.01
Varicela sin complicaciones	5	67	0	0.53	0	15	0	0.09
Tos Ferina	0	0	0	0.00	1	3	0	0.02
Hepatitis B	0	5	0	0.04	0	10	0	0.06
Infección por VIH	0	0	0	0.00	0	26	0	0.16
SIDA	0	0	0	0.00	0	16	0	0.10
Gestante con VIH	0	0	0	0.00	0	3	0	0.02
Leishmaniasis Cutanea	1	20	0	0.16	0	19	0	0.12
Leshmaniasis Mucocutanea	0	3	0	0.02	0	1	0	0.01
Efecto toxicó de plaguicidas	0	2	0	0.02	1	2	0	0.01
Lepra	0	4	0	0.03	0	1	0	0.01
TBC pulmonar c/conf. Bacteriológica	1	48	0	0.38	0	38	5	0.23
TBC pulmonar S/conf. Bacteriológica	0	12	0	0.09	0	8	0	0.05
Tuberculosis extrapulmonar	0	14	0	0.11	0	16	3	0.10
TBC Abandono recuperado	1	1	0	0.01	0	1	0	0.01
TBC Monorresistente	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
TBC Polirresistente	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00

Fuente: Noti_SP Red AA

(*) incidencia Acumulada por 1000 Hab.

Razón de Muerte Materna por 10000RN

INDICADORES EPIDEMIOLÓGICOS.

Los indicadores de monitoreo en la Red de Salud Alto Amazonas contribuyen a mejorar la disposición de información oportuna y de calidad, permiten el procesamiento y análisis para la toma de decisiones en la prevención y control de los daños sujetos a vigilancia epidemiológica en salud pública.

Figura N° 62
Cobertura de Notificación por Micro Redes y Ejes de Micro Red SE. 22- 2025.



Fuente: Unidad de Epidemiología *Hasta S.E. N° 22

Figura N° 63
Calidad de la Data por Micro Redes y Ejes de Micro Red S.E. 22– 2025



Fuente: Unidad de Epidemiología *Hasta S.E. N° 22

La calidad de la data esta semana tiene un ponderado de **Óptimo** de 99.5% de buena calidad en el consolidado en la S.E. 22 nos encontramos en un 100%.

En la semana epidemiológica N° 22 la cobertura de notificación consolidado tiene un ponderado de Bueno con el (99.3%) de 106 unidades notificantes 104 notificaron.

Figura N° 64
Oportunidad de Notificación por Micro Redes y Ejes de Micro Red S.E. 22- 2025.



Fuente: Unidad de Epidemiología *Hasta S.E. N° 22

Hasta la S.E. N° 22 la oportunidad de notificación consolidado tiene un ponderado de Regular con el (92.8%). En la S.E. 22 se tiene un calificativo de **REGULAR** de los 106 Establecimientos, notificaron oportunamente los 104. El distrito de Lagunas, Jeberos, Santa Cruz se encuentra en débil.

Boletín Epidemiológico

Año 2025 SE 22

Dirección de Red de Salud Alto Amazonas

25 al 31 de Mayo.

**Tabla N° 21. Puntaje de monitoreo de la información del sistema de vigilancia epidemiológica
Alto Amazonas, S.E. 22 – 2025.**

EJES Y MICRO REDES	CALIDAD	COBERTURA	OPORTUNIDAD	PUNTAJE TOTAL	CLASIFICACION
HOSPITAL SANTA GEMA	100.0	100.0	100.0	100.0	ÓPTIMO
HOSPITAL I YURIMAGUAS (ESSALUD)	100.0	100.0	100.0	100.0	ÓPTIMO
C.S MENTAL COMUNITARIO YGS	100.0	100.0	100.0	100.0	ÓPTIMO
C.S LA LOMA	100.0	100.0	100.0	100.0	ÓPTIMO
C.S LA CARRETERA	100.0	100.0	100.0	100.0	ÓPTIMO
C.S INDEPENDENCIA	100.0	100.0	100.0	100.0	ÓPTIMO
C.S. CLAS AGUAMIRO	100.0	100.0	100.0	100.0	ÓPTIMO
C.S SANTA MARIA	100.0	98.9	98.9	99.3	ÓPTIMO
C.S. NATIVIDAD	100.0	100.0	95.5	98.5	ÓPTIMO
C.S MUNICHIS	100.0	100.0	100.0	100.0	ÓPTIMO
C.S PAMPA HERMOSA	100.0	100.0	100.0	100.0	ÓPTIMO
C.S.GRAU KM. 40	100.0	100.0	100.0	100.0	ÓPTIMO
C. S. JEBEROS	95.5	100.0	90.2	95.2	ÓPTIMO
C.S.SHUCUSHYACU	100.0	99.5	99.0	99.5	ÓPTIMO
C.S BALSAPUERTO	100.0	100.0	93.2	97.7	ÓPTIMO
C.S.SAN GABRIEL VARADERO	100.0	100.0	87.6	95.9	ÓPTIMO
C.S. SANTA CRUZ	95.5	96.3	84.7	92.1	ÓPTIMO
C.S LAGUNAS	100.0	98.1	78.6	92.2	ÓPTIMO
TOTAL	99.5	99.3	92.8	97.2	ÓPTIMO

Fuente: Área de Epidemiología-DIREDSAA

En la S.E. N° 22, las unidades notificadoras, se encuentran en una clasificación de **ÓPTIMO**, el indicador más bajo es la **Oportunidad** con 92.8% sobre 100% calificado como **REGULAR**. en lo cual destaca que la mayoría de Ejes y micro Redes cumplen con la notificación a tiempo, pero algunos presentan graves deficiencias como Jeberos, Balsapuerto, San Gabriel de Varadero, Santa Cruz, Natividad, Santa Maria y Lagunas, lo que indica la necesidad de reforzar estrategias de vigilancia epidemiológica en estas zonas.

Criterios de Calificación para los Indicadores de Monitoreo de la Notificación.

NIVELES	OPORTUNIDAD	COBERTURA	CALIDAD DE LA DATA	RETROINFORMACION	GENERAL
OPTIMO	1). 100%	1). 100%	1). 95-100%	1). 90-100%	A). 91 - 100
BUENO	2). 95-99.9%	2). 80-99.9%	2). 90-94.9%	2). 80-89.9%	B). 81 - 90
REGULAR	3). 90-94.9%	3). 60-79.9%	3). 85-89.9%	3). 70-79.9%	C). 76 - 80
DEBIL	4). Menos de 90%	4). Menos de 60%	4). Menos de 85%	4). Menos de 70%	D). Menos de 75

Boletín Epidemiológico.

El Boletín Epidemiológico, es la publicación oficial del Área de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, de la Red de Salud de Alto Amazonas. El Boletín, se edita semanalmente a cargo del equipo de la oficina de Epidemiología - DRSAA.

El Boletín Epidemiológico, publica la situación o tendencias de las enfermedades o eventos sujetos a notificación obligatoria, las normas acerca de la vigilancia epidemiológica en salud pública en el Perú, los informes técnicos de brotes y otras emergencias sanitarias, resúmenes de trabajos de investigación desarrollados por el personal de la Red de salud de Alto Amazonas, el Área de Epidemiología y otras informaciones de interés para el personal de salud.

Título:

Boletín Epidemiológico Semanal.

Correo electrónico

Epide160201@yahoo.com

Web

www.diredsaa.gob.pe/boletin

La información del presente Boletín Epidemiológico procede de la notificación de 101 establecimientos de salud. La información contenida en la sección de tendencia del boletín es actualizada cada semana o mes. Los datos y análisis son provisionales y pueden estar sujetos a modificación. Esta información es suministrada semanalmente por la Red de Salud de Alto Amazonas el Área de Epidemiología.

Obst. Percy Sanchez Vergaray.
Director de la Red de Salud A.A

Obst. Jhon James Valles Pérez.
Sub director de la Red de Salud A.A

Lic. Enf. Nelly Lizeth Escobar Ramos.
Área de Epidemiología DRSAA.

Equipo Técnico:



Lic. Enf. Marleny B. Muñoz Quispirina.

C.D. Daniel Barrutia Araujo.

Biolg. Karen Ines Huaman Silva.

Tec. Enf. Ana A. Peltroche Córdova.

Tec. Enf. Lester Vela Tello.

Tec. Enf. Cesia K. Saavedra Shapiama.

Tec. Enf. Segundo Rosbel Soria
Saavedra.

