



CENTRO REGIONAL DE SALUD DE LORETO


DIRECCIÓN DE RED DE SALUD ALTO  
AMAZONAS  
BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO  
SEMANAL  
ÁREA DE EPIDEMIOLOGÍA



### "Día Mundial del Donante de Sangre."

El Día Mundial del Donante de Sangre se celebra el 14 de junio de cada año, proclamado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) con la finalidad de sensibilizar a la población acerca de la importancia de donar sangre, para contribuir con la salud de pacientes que requieren transfusiones. También se trabaja para establecer sistemas e infraestructuras, destinadas a incrementar las donaciones de sangre y productos sanguíneos seguros para transfusiones, con el apoyo de los gobiernos y las autoridades sanitarias.

La fecha de esta efeméride conmemora el nacimiento de **Karl Landsteiner**, patólogo y biólogo austriaco que descubrió y tipificó los grupos sanguíneos, motivo por el cual se le concedió el Premio Nobel de Medicina en el año 1930. El lema de la campaña de este año es: "**Dona sangre, dona esperanza: juntos, salvamos vidas**". Con este mensaje se resalta la capacidad de los donantes de sangre para dar vida a quienes la necesitan. Se trata de que la población tome conciencia de que es posible salvar vidas mediante el simple acto de donar sangre. En lo cual debemos de promover este tema haciendo diversas actividades como actos conmemorativos, reuniones y talleres, ceremonias de agradecimiento a donantes, campañas en las redes sociales, programas especiales en los medios de comunicación. La transfusión sanguínea es un procedimiento médico, mediante el cual se transfiere sangre de una persona a otra para reponer los componentes sanguíneos que disminuyen por causa de una cirugía, lesión, trastorno hemorrágico o enfermedad (cáncer, hemofilia, diabetes, entre otros).



#### Director de la Red de Salud

Obst. Percy Sanchez Vergaray.

#### Área de Epidemiología.

Lic. Enf. Nelly L. Escobar Ramos.

#### Equipo Técnico:

Lic. Enf. Marleny B. Muñoz  
Quispirina.

C.D. Daniel A. Barrutia Araujo.

Blgo. Karen Huaman Silva

Tec. Enf. Ana A Peltroche Córdova.

Tec. Enf. Léster Lenin Vela Tello.

Tec. Enf. Cesia K. Saavedra

Shapiama.

Email:[epide160201@yahoo.com](mailto:epide160201@yahoo.com)Web: [www.epi.diresa-aa.gob.pe](http://www.epi.diresa-aa.gob.pe)

#### DAÑOS NOTIFICADOS EN LA SEMANA

Infecciones respiratorias agudas	355
EDA acuosa	169
Dengue sin señales de alarma	60
Varicela S/C	09
Leptospirosis	08
SOB/ASMA	06
Dengue con Señales de Alarma	06
Sífilis N/E	06
Neumonía <5 años	04
Leishmaniasis cutánea	03
Sífilis Materna	02
Ofidismo	01
Leishmaniasis Mucocutáneo	01
Eda Disentérica	00
Tos Ferina	00
Malaria por p. Vivax	00

SITUACIÓN DE SALUD**I.- ENFERMEDADES TRASMITIDAS POR VECTORES****1.1.- MALARIA POR PLASMODIUM VIVAX Y FALCIPARUM**

El año 2025 hasta la S.E. 24 se ha notificado a nivel Provincial 67 casos de Malaria, con un promedio semanal de 03 casos, Tasa de incidencia acumulada (TIA) de 0.53 por 1000 habitantes. El 100% (67) de los casos corresponde a Plasmodium Vivax y el 0% (0 casos) a Plasmodium Falciparum.

El Distrito de Balsapuerto reporta la mayor incidencia de casos 1.53 por 1000 habitantes de los casos de Malaria en la provincia de Alto Amazonas.

En la Semana Epidemiológica (SE) 24- 2025, no se notificó casos de malaria a nivel provincial, reportándose una Disminución del 75 % (222) casos que el año 2024 en el mismo período. Tabla N°01.


**Tabla N°01. Casos de malaria por inicio de síntomas, Provincia de Alto Amazonas, 2025 a la (S.E.24)**

Distritos	2024				2025				Variación 2024 - 2025	Comportamiento del año 2025 en relación al 2024
	SE-24	Acumulado SE-24	TIA(1000 hab.)	Defunciones	SE-24	Acumulado SE-24	TIA(1000 hab.)	Gestante		
Balsapuerto	7	186	10.21	0	0	28	1.53	0	0	DISMINUCIÓN
Jeberos	0	0	0.00	0	0	7	1.29	0	0	INCREMENTO
Lagunas	0	34	2.32	0	0	2	0.14	0	0	DISMINUCIÓN
Santa Cruz	0	0	0.00	0	0	2	0.44	0	0	INCREMENTO
Trte. Cesar Lopez Rojas	0	0	0.00	0	0	1	0.14	0	0	INCREMENTO
Yurimaguas	2	69	0.91	0	0	27	0.35	0	0	DISMINUCIÓN
Provincia de Alto Amazonas	9	289	2.29	0	0	67	0.53	0	0	DISMINUCIÓN

Fuente: Notiweb-Individual

Elaborado: Área de Epidemiología-DIREDSAA

**Figura N° 01. Canal de casos de malaria en la Provincia de Alto Amazonas – 2025 a la S.E. 24.**




Fuente: Notiweb-Individual

Elaborado: Área de Epidemiología-DIREDSAA

El canal endémico provincial para Malaria muestra; en la semana 03 tenemos un leve ingreso a **zona de alarma**, semanas posteriores hasta la actualidad continuamos en **zona de éxito**. Por lo que es necesario adoptar medidas de control de manera inmediata en las localidades afectadas. La situación de esta semana epidemiológica posiblemente responde a los habituales retrasos en la notificación. (Figura N° 01).

**Figura N°02. Casos de Malaria, Provincia de Alto Amazonas 2014-2025.**



Fuente: Notiweb-Individual

Elaborado: Área de Epidemiología-DIREDSA

Según la curva epidemiológica, que desde el año **2014 al 2018** la tendencia fue al incremento; sin embargo, en los años 2019-2021 se redujo el número de casos en un 78.8%. Entre los años 2022-2023 los casos se acrecentaron en un 61.5%, en comparación al año anterior; en **2024** se observa una evidente reducción de casos con **72.1%** en relación al año **2023**; lo que va del presente año, tenemos notificados **67** casos de malaria Vivax hasta la S.E 24 lo que representa una TIA de 0.41 x1000 hab.


**Figura N° 04. Mapa de Riesgo, Provincia de Alto Amazonas, 2025.**



Fuente: Notiweb-Individual

Elaborado: Área de Epidemiología-DIREDSA

**Figura N° 03. Casos de Malaria por grupo de edades Provincia de Alto Amazonas 2025.**



Fuente: Notiweb-Individual

Elaborado: Área de Epidemiología-DIREDSA

La mayoría de casos corresponde a la etapa de vida niña-niña (0-11 años), con 37% (25 casos), seguido por etapa adolescentes (12 -17 años) con el 25% (17 casos), Adulto (30-59 años) con 15% (10 casos), de Adulto joven (18 - 29 años) con 20% (13 casos), Adulto Mayor (>60) con 3% (02 casos), y (Figura N°03).

Según nuestra Figura N° 04, la S.E. N° 24 el distrito de Santa Cruz, Lagunas, Tnte. Cesar Lopez Rojas y Yurimaguas, el Distrito de Jeberos y Balsapuerto, se encuentra el Bajo Riesgo. Es necesario continuar con las actividades de prevención y control de esta enfermedad priorizando las localidades que se encuentran en mayor riesgo.

## 1.2.- DENGUE

El dengue representa un desafío creciente para la salud pública en Perú, intensificado por brotes frecuentes que se ven agravados por la alta densidad poblacional en áreas urbanas y factores ambientales que favorecen la proliferación del mosquito Aedes aegypti, portador del agente causal. El cambio en las condiciones climáticas, incluyendo el aumento de las temperaturas y las variaciones en los patrones de lluvia, ha intensificado este problema.

En este año 2025 la Provincia de Alto Amazonas hasta la S.E. N° 24 notifica 1543 casos de dengue, de estos el 38% (587 casos) son probables y el 62% (956 casos) son confirmados, Además, se observa un incremento en el número de casos de dengue en comparación con el año 2024. Se ha notificado 01 defunción en el distrito de Yurimaguas. Según la forma clínica de la enfermedad el 87% (1363) son casos de Dengue sin signos de alarma, 12% (176) casos de Dengue con señales de alarma y 2% (4) Dengue Grave (tabla 2). En cuanto al serotipo del virus del dengue que circulan en la provincia de Alto Amazonas predominan la presencia de 2 serotipos, DEN-2, DEN-3.


**Tabla N° 02. Casos de dengue por inicio de síntomas y por distritos de la Provincia de Alto Amazonas 2024-2025.**

Distritos	2024					2025					Variación 2024 - 2025	Comportamiento del año 2025 en relación al 2024
	SE 24	Acumulado SE 24	TIA(100 0 hab.)	Gestante	Defunciones	SE 24	Acumulado SE 24	TIA(100 0 hab.)	Gestante	Defunciones		
Balsapuerto	0	0	0.00	0	0	0	18	0.70	0	0	18	INCREMENTO
Jeberos	0	3	0.55	0	0	0	37	5.36	1	0	34	INCREMENTO
Lagunas	4	161	10.97	0	0	4	172	11.38	9	0	11	INCREMENTO
Santa cruz	0	0	0.00	0	0	3	36	6.69	0	0	36	INCREMENTO
Tnte. Cesar Lopez Rojas	0	1	0.14	0	0	0	37	5.24	2	0	36	INCREMENTO
Yurimaguas	39	1343	17.36	0	0	29	1243	12.13	25	1	-100	DISMINUCIÓN
Provincia de Alto Amazonas	43	1508	11.85	0	0	36	1543	9.48	37	1	35	INCREMENTO

Fuente: Notiweb-Individual

Elaborado: Área de Epidemiología-DIREDSA

**Figura N° 05. Tendencia semanal de casos de dengue en la Provincia de Alto Amazonas, 2021-2025 hasta S.E 24.**




Fuente: Notiweb-Individual

Elaborado: Área de Epidemiología-DIREDSA

La incidencia de casos en el año 2022 fue de 20.80% x 1000 hab., se reportó un acumulado de 2947 casos con 4 fallecidos, en el año 2023 la incidencia fue de 17.49% x1000 hab, se reportó 2201 casos, mientras que en el año 2024 la incidencia fue de 45.21% x 1000 hab, los casos persistieron durante todo el año con un promedio de 86 casos por semana epidemiológica, alcanzando el pico más alto con un acumulado de 4447 casos , en lo que va del año 2025 la incidencia de casos es de 9.% x 1000 hab, hasta la S.E 24 se reportan 1543 casos con 01 fallecido.

**Figura N° 06. Canal endémico de casos de dengue en la Provincia de Alto Amazonas – 2024-2025 hasta S.E. 24.**




Fuente: Notiweb-Individual

Elaborado: Área de Epidemiología-DIREDSA

El canal Endémico en el año 2024 hubo un pico epidémico significativo en cierto periodo, mientras que en 2025 los casos prevalecen con una leve disminución y se encuentra **zona de epidemia**. Es importante señalar que este enfoque corresponde a la dinámica de la enfermedad, por lo que resulta imperativo tomarlo con cautela y tener en cuenta que los pronósticos pueden variar con la actualización periódica de datos semanales.

**Figura N° 07. Casos de dengue por grupo de edades Provincia de Alto Amazonas 2025.**

Etapas de Vida	Femenino	Masculino	TTT	%
Niños (0 - 11 años)	227	272	499	29.63
Adolescentes (12 - 17 años)	128	135	263	19.65
Adulto Joven (18 - 29 años)	152	93	245	18.34
Adulto (30 - 59 años)	260	171	431	26.74
Adulto Mayor (60 a mas años)	56	49	105	5.65
<b>Total</b>	<b>823</b>	<b>720</b>	<b>1543</b>	<b>100</b>



Fuente: Notiweb-Individual

Elaborado: Área de Epidemiología-DIREDSA

La mayoría de casos corresponde a la etapa de vida Adulto (30-59 años) con 28% (431 casos), seguido de vida niña-niña (0-11 años), con 32% (496 casos), seguido de Adulto joven (18 - 29 años) con 16 % (245 casos) por etapa adolescentes (12 -17 años) con el 17% (263 casos) y etapa Adulto Mayor (>60) con 7% (105 casos) (Figura N°07).

**1.3.- LEISHMANIASIS (B55.1, B55.2)**

La Leishmaniasis es una enfermedad causada por protozoos del género de leishmania, transmitida por la picadura de flebótomos (mosquito de arena). La leishmaniasis es un problema de salud en regiones tropicales y subtropicales. Hasta la S.E 24 se han notificado en el acumulado de 25 casos de Leishmaniasis probables, el 88% (21 casos) por Leishmaniasis cutánea y el 12% (03 casos) por leishmaniosis mucocutánea.

**1.3.1.- LEISHMANIASIS CUTÁNEA**

La Leishmaniosis Cutánea es la forma más común de esta enfermedad parasitaria y es causada por protozoos del género de leishmania, provocando ulceras en la piel que puedan causar cicatrices. Este año 2025 en esta semana se presentó 01 caso, se tiene un acumulado de 22 casos con una TIA de 0.14 x 1000 habitantes. Los distritos con incremento son Jeberos, Lagunas, Santa Cruz y Tnte Cesar López Rojas.

**Tabla N° 03. Casos de Leishmaniasis Cutánea por inicio de síntomas y por distritos de la Provincia de Alto Amazonas 2024-2025.**

Distritos	2024				2025				Variación 2024 - 2025	Comportamiento del año 2025 en relación al 2024
	SE 24	Acumulado SE 24	TIA(1000 hab.)	Defunciones	SE 24	Acumulado SE 24	TIA(1000 hab.)	Defunciones		
Balsapuerto	0	7	0.38	0	0	3	0.12	0	-4	DISMINUCIÓN
Jeberos	1	1	0.18	0	1	3	0.43	0	2	INCREMENTO
Lagunas	0	2	0.14	0	0	2	0.13	0	0	SIN VARIACIÓN
Santa Cruz	0	2	0.44	0	0	6	1.11	0	4	INCREMENTO
Tnte. Cesar Lopez Rojas	0	1	0.14	0	0	6	0.85	0	5	INCREMENTO
Yurimaguas	1	8	0.10	0	0	2	0.02	0	-6	DISMINUCIÓN
Provincia de Alto Amazonas	2	21	0.17	0	1	22	0.14	0	1	INCREMENTO

Fuente: Notiweb-Individual

Elaborado: Área de Epidemiología-DIREDSAA

**1.3.2.- LEISHMANIASIS MUCOCUTÁNEA**

Es una enfermedad severa de leishmaniasis, causada principalmente por leishmania braziliensis y se transmite a través de la picadura de los flebótomos(lutzamyia). Afecta la piel y las membranas mucosas de la nariz, boca y garganta en lo cual puede causar deformaciones graves. Hasta la semana N° 24 se tiene como acumulado de 03 casos, se debe continuar con la búsqueda activa.


**Tabla N° 04. Casos de Leishmaniasis Mucocutánea por inicio de síntomas y por distritos de la Provincia de Alto Amazonas 2024-2025.**

Distritos	2024				2025				Variación 2024 - 2025	Comportamiento del año 2025 en relación al 2024
	SE 24	Acumulado SE 24	TIA(1000 hab.)	Defunciones	SE 24	Acumulado SE 24	TIA(1000 hab.)	Defunciones		
Balsapuerto	0	0	0.00	0	0	1	0.04	0	1	INCREMENTO
Jeberos	0	1	0.18	0	0	1	0.14	0	0	SIN VARIACIÓN
Lagunas	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	SIN VARIACIÓN
Santa Cruz	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	SIN VARIACIÓN
Tnte. Cesar Lopez Rojas	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	SIN VARIACIÓN
Yurimaguas	0	2	0.03	0	1	1	0.01	0	-1	DISMINUCIÓN
Provincia de Alto Amazonas	0	3	0.02	0	1	3	0.02	0	0	SIN VARIACIÓN

Fuente: Notiweb-Individual

Elaborado: Área de Epidemiología-DIREDSAA


**Figura N° 08. Casos de Leishmaniasis cutánea y mucocutánea por grupo de edad 2025.**



Fuente: Notiweb-Individual

Elaborado: Área de Epidemiología-DIREDSAA

**Figura N° 09. Casos de Leishmaniasis Cutánea y mucocutánea, Provincia de Alto Amazonas 2020 - 2025.**



Fuente: Notiweb-Individual

Elaborado: Área de Epidemiología-DIREDSAA

La mayoría de casos corresponde a la etapa de vida Adulto (30-59 años) con 52% (13 casos), seguido de niños (0-11 años) con 4% (1 caso), Adulto joven (18 - 29 años) con 28% (7 casos), Adulto Mayor (>60) con 4% (1 caso), y adolescentes (12 -17 años) con el 12% (3 casos). (Figura N°8). Se observa que la leishmaniasis cutánea es la más y la tendencia indica una disminución progresivamente hasta el 2025 lo que indica una reducción en la afectación poblacional. (Figura 09).

## II. ENFERMEDADES ZOÓNOTICAS

### 2.1.- LEPTOSPIROSIS (A27)

La Leptospirosis es una enfermedad Zoonótica causada por la bacteria Leptospira interrogans, que es patógena para los hombres y los animales, con más de 200 variedades serológicas o serovariiedades. La leptospirosis puede presentarse con una amplia variedad de manifestaciones clínicas, desde una forma leve a una enfermedad grave y a veces fatal. Tiene potencial epidémico, generalmente después de lluvias intensas. Sus síntomas pueden parecerse a varias enfermedades, como influenza, dengue y otras enfermedades hemorrágicas de origen viral; es importante el diagnóstico correcto (clínico y de laboratorio) al inicio de los síntomas para evitar casos graves y salvar vidas principalmente en situaciones de brotes, en la S.E. N° 24 se notificó 01 caso de Leptospirosis, con un Acumulado de 490 casos con una tasa de incidencia (TIA) 3.01 x 1000 habitantes. Los casos de leptospirosis de incremento en la mayoría de distritos y estos datos resaltan la importancia de la vigilancia epidemiológica y posibles medidas de control en los distritos con mayor incremento.


**Tabla N°05. Casos de Leptospirosis por inicio de síntomas y distritos de la Provincia de Alto Amazonas, 2024- 2025\***

Distritos	2024				2025				Variaciones 2024 - 2025	Comportamiento del año 2025 en relación al 2024
	S.E. N° 24	Acumulado S.E. N° 24	TIA(1000 hab.)	Defunciones	S.E. N° 24	Acumulado S.E. N° 24	TIA(1000 hab.)	Defunciones		
Balsapuerto	0	1	0.05	0	0	13	0.56	0	12	INCREMENTO
Jeberos	0	0	0.00	0	0	4	0.58	0	4	INCREMENTO
Lagunas	0	0	0.00	0	0	70	4.63	0	70	INCREMENTO
Santa Cruz	0	2	0.44	0	0	7	1.30	0	5	INCREMENTO
Tnt. Cesar Lopez Rojas	0	0	0.00	0	0	26	3.68	0	26	INCREMENTO
Yurimaguas	36	159	2.06	0	1	370	3.51	0	211	INCREMENTO
Provincia de Alto Amazonas	36	162	1.27	0	1	490	3.01	0	-12	DISMINUCIÓN

Fuente: Notiweb-Individual

Elaborado: Área de Epidemiología-DIREDSA

**Figura N° 10. Tendencia Semanal de Casos de Leptospirosis, Provincia de Alto Amazonas 2022-2025.**




Fuente: Notiweb-Individual

Elaborado: Área de Epidemiología-DIREDSA

En 2022 y 2023, los casos de leptospirosis se mantuvieron en niveles bajos con pocos picos de aumento. En 2024, hubo un incremento significativo en el número de casos, con un gran aumento en la segunda mitad del año. El año 2025 en lo que va hasta la S. E. 24, la tendencia de los casos disminuyó en comparación con a la semana anterior. Esto indica un aumento preocupante en la incidencia de leptospirosis en los últimos años, posiblemente relacionados con factores ambientales, climáticos o de salud pública.

**Figura N° 11. Casos de Leptospirosis por grupo de edades Provincia de Alto Amazonas 2025.**



La mayoría de casos corresponde a la etapa de vida niñez-niña (0-11 años) con 24% (118 casos) seguido por etapa de vida Adulto (30-59 años) con 32% (156 casos), Adulto joven (18 - 29 años) con 19% (94 casos), Adolescentes (12 - 17 años) con el 19% (93 casos) y Adulto Mayor (>60) con 6% (29 casos). Esto sugiere que los niños y adultos son los grupos más afectados, posiblemente debido a factores de exposición ambiental o laborales.

Fuente: Notiweb-Individual

Elaborado: Área de Epidemiología-DIREDSA

## 2.1.- OFIDISMO (X20)

Es el síndrome causado por la inoculación de sustancias venenosas de alguna de las serpientes venenosas. Existen unas tres mil especies de serpientes en el mundo, de ellas al menos el 10% son venenosas para el ser humano. Las familias de serpientes consideradas venenosas son cinco: Viperidae, Elapidae, Hydrophidae, Atractaspididae y Colubridae. En el Perú, los nombres de las serpientes están en relación con las aéreas geográficas y cada una adopta un nombre diferente, así tenemos: el género *Lachesis* (shushupe) se encuentra solo en la selva, el género *Crotalus* (cascabel) se encuentra en Sandia (Puno) y Tambopata (Madre de Dios), los géneros *Bothrops* (jergón) y *Micrurus* (corales) se encuentran en la costa, sierra y selva. Este daño es constante en nuestra Provincia sobre todo en épocas de lluvia por eso el personal de salud debe estar capacitado para tomar en forma rápida medidas de acción que no pongan en riesgo la vida del paciente.

En la semana epidemiológica N° 24 se reportó 01 caso de ofidismo, con un Acumulado de 56 casos con una tasa de incidencia acumulada (IA) 0.34 por 1000 habitantes.


**Tabla N° 06. Casos de Ofidismo por inicio de síntomas y distritos de la Provincia de Alto Amazonas, 2024- 2025.**

Distritos	2024				2025				Variacion 2024- 2025	Comportamiento del año 2025 en relación al 2024
	24	Acumulado S.E. N° 24	TIA(1000 hab.)	Defunciones	24	Acumulado S.E. N° 24	TIA(1000 hab.)	Defunciones		
Balsapuerto	0	5	0.27	0	0	10	0.43	0	5	INCREMENTO
Jeberos	0	4	0.74	0	0	9	1.30	0	5	INCREMENTO
Lagunas	0	10	0.68	0	0	3	0.20	0	-7	DISMINUCIÓN
Santa Cruz	1	3	0.66	0	0	4	0.74	0	1	INCREMENTO
Tnt, Cesar Lopez Rojas	1	9	1.30	1	1	9	1.27	0	0	SIN VARIACION
Yurimaguas	1	23	0.30	0	0	21	0.20	0	-2	DISMINUCIÓN
Provincia de Alto Amazonas	3	54	0.42	1	1	56	0.34	0	2	INCREMENTO

Fuente: Notiweb-Individual

Elaborado: Área de Epidemiología-DIREDSA

**figura N° 12. Tendencia de Casos de Ofidismo, Provincia de Alto Amazonas 2025**




En el 2022 se alcanzó una frecuencia relativamente baja de casos semanales, en el año 2023 hay un leve incremento en la variabilidad de casos presentándose hasta 8 casos. En 2024 se mantiene una tendencia similar a 2023, aunque se identifican semanas con picos más altos. En lo que va al 2025 a la S.E. 24 se reporta varios picos, superando 6 casos en ciertas semanas. (Figura N° 12).

Fuente: Notiweb-Individual

Elaborado: Área de Epidemiología-DIREDSA

**Figura N° 13. Casos de Ofidismo por grupo De edad, Provincia de Alto Amazonas 2025.**



Fuente: Notiweb-Individual

Elaborado: Área de Epidemiología-DIREDSAA

La mayoría de los casos corresponde a la etapa adulto (30 - 59 años) con 41% (23 casos), seguido con la etapa de Adolescentes (12 - 17 años) con 25% (14 casos), etapa de vida Adulto Joven (18-29 años) con 22% (12 casos), Adulto Mayor (>60) con 7% (04 casos), y etapa de vida niño-niños (0-11 años) con 5% (3 casos).

### **III.- OTRAS ENFERMEDADES SUJETAS A VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA**

#### **3.1.- ENFERMEDAD DIARREICA AGUDAS.**

##### **3.1.1. ENFERMEDAD DIARREICA AGUDAS ACUOSAS**

Las EDAs clasificadas como diarrea aguda acuosa, se define por presentar aumento en frecuencia (3 o más veces en 24 horas), fluidez y/o volumen de las deposiciones en comparación a lo habitual, con pérdida variable de agua y electrolitos y cuya duración es menor de 14 días.

En la SE N° 24 de este año, se notifica 169 con un acumulado de 3440 casos de EDA acuosa TIA 22.23 X 1000, hab. con un 11 % de incremento a comparación del año 2024. (Tabla N°07)

Los incrementos de las EDAs se presentaron en los distritos de Jeberos, Lagunas, Santa Cruz, Tnte. Cesar Lopez Rojas y Yurimaguas. Es crucial reforzar la vigilancia y las acciones preventivas para reducir la incidencia ya que en estas épocas hay temporadas de lluvias en la selva, ocasionando desbordes de los ríos que vienen afectando a las comunidades por consiguiente afectando a su consumo de agua de la población.


**Tabla N° 07. Casos de enfermedad diarreica acuosa en la Provincia de Alto Amazonas, 2024 – 2025.**

Distritos	Semanas epidemiológicas SE. N° 24								Variación 2024 - 2025	Comportamiento del año 2025 en relación al 2024	
	2024				2025						
	Nº Episodios SE. 24	Nº Episodios Acumulado	TIA (1000 Hab)	Defunciones SE. 24	Defunciones Acumulado	Nº Episodios SE. 24	Nº Episodios Acumulado	TIA (1000 Hab)	Defunciones SE. 24	Defunciones Acumulado	
Balsapuerto	39	653	35.70	0	0	24	535	20.71	0	0	-118
Jeberos	8	137	25.31	0	0	5	148	21.46	0	0	11
Lagunas	20	410	75.73	0	6	15	418	27.65	0	0	8
Santa Cruz	2	107	23.54	0	0	14	268	49.79	0	0	161
Tnte. Cesar López Rojas	3	179	25.80	0	0	8	256	36.24	0	0	77
Yurimaguas	82	1785	23.07	0	0	103	1993	19.45	0	0	208
<b>Total Alto Amazonas</b>	<b>154</b>	<b>3271</b>	<b>25.71</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>169</b>	<b>3618</b>	<b>22.23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>347</b>

Fuente: Notiweb-EDA

Elaborado: Área de Epidemiología-DIREDSAA


**Figura N° 14. Episodios de diarreicas agudas acuosas por grupos de edad, 2025.**



Fuente: NotiWeb. - EDA

Elaborado: Área de Epidemiología-DIREDSA

**Figura N° 15. Tendencia de episodios de EDAA, Provincia de Alto Amazonas 2022 – 2025.**




Fuente: NotiWeb-EDA

Elaborado: Área de Epidemiología-DIREDSA

Los Episodios de enfermedades diarreas agudas (EDAs), a la S.E. 24, con mayores casos presentados fueron en el grupo de edad de 5 a más años haciendo 52% con (1861 casos), luego los menores de 1 a 4 años con 38% (1385 casos), y con menor casos en los menores de 1 año con 10% (372 casos). (Figura N°14). La tendencia de los casos de diarrea acuosa en 2022 y 2023 presentan una variabilidad moderada, con unas fluctuaciones en el número de casos en 2024 se nota un incremento significativo, con picos más alto en comparación de años anteriores y en este año 2025 hasta la semana 24 nos muestra un incremento (fig.15).

**Figura N°16. Canal endémico de episodios de EDAA, Provincia de Alto Amazonas, 2025.**



Fuente: Epidemiología \_ DIREDSA

El canal endémico de episodios de EDA acuosa en la Provincia de Alto Amazonas nos muestra un incremento en relación con la última semana y se encuentra en **ZONA DE EPIDEMIA**, lo que podría estar relacionado con factores climáticos, calidad del agua o problemas de saneamiento. (Figura N°16).

### 3.1.2. ENFERMEDAD DIARREICA AGUDAS DISENTÉRICAS.

Diarrea aguda disentérica, se presenta aumento en frecuencia y fluidez de las deposiciones, de volumen escaso o moderado y que además evidencia en las heces sangre visible y moco comúnmente causada por infecciones bacterianas como shigella o entamoeba histolytica. En la S.E 24 EDA disentérica no se presentaron casos, con un acumulado de 62 casos de EDA disentéricas TIA 0.38 X 1000 hab. en general encontramos una disminución en comparación al año 2024. Se debe mantener las medidas preventivas para evitar brotes.


**Tabla N° 08. Casos de enfermedad diarreica disentérica, 2024 – 2025.**

Distritos	Semanas epidemiológicas SE N° 24										Comportamiento del año 2025 en relación al 2024	
	2024					2025						
	Episodios SE 24	Episodios Acumulado	TIA (1000 Hab)	Defunciones SE. 24	Defunciones Acumulado	Episodios SE 24	Episodios Acumulado	TIA (1000 Hab)	Defunciones SE. 24	Defunciones Acumulado		
Balsapuerto	0	11	0.60	0	0	0	20	0.77	0	0	9	
Jeberos	0	2	0.37	0	1	0	1	0.14	0	0	-1	
Lagunas	0	5	0.92	0	1	0	14	0.93	0	0	9	
Santa Cruz	0	9	1.98	0	0	0	5	0.93	0	0	-4	
Tnt. Cesar López Rojas	0	0	0.00	0	0	0	1	0.14	0	0	1	
Yurimaguas	0	15	0.19	0	0	0	21	0.20	0	1	6	
Total Alto Amazonas	0	42	0.33	0	2	0	62	0.38	0	1	20	

Fuente: NotiWeb-EDA

Elaborado: Área de Epidemiología-DIREDSAA


**Figura N°17. Episodios de enfermedades diarreicas disentéricas por grupos de edad en la Provincia de Alto Amazonas, 2025.**



Fuente: NotiWeb-EDA

Elaborado: Área de Epidemiología \*Hasta S.E. N°24

**Figura N° 18. Porcentaje de episodios de EDAS acuosas y disentéricas por distritos, Provincia de Alto Amazonas, 2025.**




Fuente: NotiWeb- EDA

Elaborado: Área de Epidemiología\*Hasta S.E. N°24

Los Episodios de enfermedades diarreas agudas disentéricas, hasta la S.E. 24 se presentaron en la etapa de vida de 5 a más años con el 55% con (34 casos), 1-4 años con 35% (22 casos) y <1 año con 10% (06 casos). (Fig. N°17).

Figura N° 19. Canal endémico de episodios de EDA disentéricas, provincia de Alto Amazonas, 2025.



Fuente: NotiWeb-EDA

Elaborado: Área de Epidemiología \_ DIREDSAA

El canal endémico de episodios de EDA Disentéricas en la provincia de Alto Amazonas nos muestra un incremento en relación a la última semana y se encuentra en **ZONA DE ALARMA**.

### 3.2.1 INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS (IRA)

Las Infecciones Respiratoria agudas son enfermedades del tracto respiratorio que pueden afectar desde la nariz y garganta (vías respiratorias superiores) hasta los pulmones (vías respiratorias inferiores). Estas infecciones pueden ser causantes por virus o bacterias y se transmiten principalmente por contacto con secreciones o superficies contaminadas. En la Provincia de Alto Amazonas en la S.E. 24 se han notificado 355 episodios de IRA en menores de 5 años, con un acumulado de 7190 casos lo que representa una incidencia acumulada (IA) de 363.79% por cada 1000 menores de 5 años.


Tabla N° 09. Casos de infecciones respiratorias agudas en la Provincia de Alto Amazona, 2024 –2025

Distritos	Semanas epidemiológicas SE N° 24						Variación 2024 - 2025	Comportamiento del año 2025 en relación al 2024		
	2024			2025						
	Nº Episodios SE 24	Acumulado	TIA (1000 Hab)	Nº Episodios SE 42	Acumulado	TIA (1000 Hab)				
Balsapuerto	77	1260	578.25	46	1250	284.61	-10	DISMINUCIÓN		
Jeberos	12	488	756.59	1	493	423.54	5	INCREMENTO		
Lagunas	38	804	459.95	46	917	589.71	113	INCREMENTO		
Santa Cruz	12	248	458.41	27	518	704.76	270	INCREMENTO		
Tnte. Cesar López Rojas	15	377	456.42	13	378	485.24	1	INCREMENTO		
Yurimaguas	232	4433	481.12	222	3634	326.24	-799	DISMINUCIÓN		
<b>Total Alto Amazonas</b>	<b>386</b>	<b>7610</b>	<b>502.21</b>	<b>355</b>	<b>7190</b>	<b>363.79</b>	<b>-420</b>	<b>DISMINUCIÓN</b>		

Fuente: NotiWeb-IRA

Elaborado: Área de Epidemiología-DIREDSAA


**Figura N° 20. Episodios de Infecciones Respiratorias Agudas por grupos de edad en la Provincia de Alto Amazonas, 2025.**



Fuente: NotiWeb-IRA

Elaborado: Área de Epidemiología \*Hasta S.E. N°24

**Figura N° 21. Canal endémico de episodios de IRAS en menores de 5 años en la Provincia de Alto Amazonas 2025.**



Fuente: NotiWeb-IRA

Elaborado: Área de Epidemiología\*Hasta S.E. N°24

La etapa de vida afectadas es (1 a 4 años), con el 72% (5459 casos), seguido (2-11 meses) con el 25% (1857 casos) y la etapa con menor casos (<2 meses), con 3% (229 casos), (fig. 20); en las primeras semanas epidemiológicas del año, los casos se encuentran en la zona de alarma y epidemia. En esta semana se encuentra en **ZONA DE ALARMA** se recomienda fortalecer medidas preventivas, como vacunación, promoción de higiene respiratoria y estrategias de reducción de contagios en poblaciones vulnerables. (fig. 21).

### 3.2.2 NEUMONIA EN MENORES DE 05 AÑOS.

Es una infección respiratoria que afecta a los pulmones y es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en este grupo etario. Se caracteriza por inflamación y acumulación de líquido en los alvéolos lo que dificulta la respiración. Hasta la S.E. 24 del presente año se notificaron 131 episodios de neumonía, lo que representa una incidencia acumulada (IA) de 6.63 por cada 1000 menores de 5 años. La tasa y el número de episodios de neumonías, en lo que va del año, se presenta una disminución de 14% (28 casos) con respecto del mismo periodo del año 2024. El distrito de Yurimaguas presenta la tasa de incidencia elevada de 7.90 por 1000 menores de 5 años.


**Tabla N°10. Casos de Neumonía en menores de 5 años en la Provincia de Alto Amazonas, 2024-2025.**

Distritos	Semanas epidemiológicas SE N° 24								Variación 2024 - 2025	Comportamiento del año 2025 en relación al 2024		
	2024				2025							
	Nº Episodios SE 24	Acumulado	TIA (1000 Hab)	Defunciones SE. 24	Defunciones Acumulado	Nº Episodios SE 24	Acumulado	TIA (1000 Hab)	Defunciones SE. 24	Defunciones Acumulado		
Balsapuerto	0	37	16.98	0	0	0	4	0.91	0	0	-33	DISMINUCIÓN
Jeberos	0	0	0.00	0	0	0	1	0.86	0	0	1	INCREMENTO
Lagunas	1	17	9.73	0	1	3	25	16.08	0	0	8	INCREMENTO
Santa Cruz	0	3	5.55	0	0	0	9	12.24	0	0	6	INCREMENTO
Tnte. Cesar López Rojas	2	4	4.84	0	1	0	4	5.13	0	0	0	SIN VARIACIÓN
Yurimaguas	1	98	10.64	0	1	1	88	7.90	0	0	-10	DISMINUCIÓN
<b>Total Alto Amazonas</b>	<b>4</b>	<b>159</b>	<b>10.49</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>131</b>	<b>6.63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28</b>	<b>DISMINUCIÓN</b>

Fuente: NotiWeb-IRA

Elaborado: Área de Epidemiología-DIREDSA


**Figura N° 22. Grupos de edad afectados por Neumonías en menores 5 años en la Provincia de Alto Amazonas, 2025.**



Fuente: NotiWeb-IRA

Elaborado: Área de Epidemiología \*Hasta S.E. N° 24

**Figura N° 23. Canal endémico de episodios de Neumonía en menores de 5 años en la Provincia de Alto Amazonas, 2025.**



Fuente: NotiWeb-IRA

Elaborado: Área de Epidemiología \*Hasta S.E. N° 24

La mayoría de los casos afectados por Neumonías corresponde a niños de los niños de (1 - 4 años) con 68% (89 casos) seguido de (2-11 meses) con 31% (40 casos), y niños (<2 meses) con 1% (2 casos). (fig. 22). Se debe continuar con la vigilancia de dicho daño ya que los menores de 05 años es el grupo más vulnerable. El canal endémico provincial de Neumonías en la provincia de Alto Amazonas nos muestra un aumento en relación a la última semana y se encuentra en **Zona de Alarma**. (fig. 23).

### 3.2.3 SINDROME OBSTRUCTIVO BRONQUIAL AGUDO (SOB/ASMA).

Es un conjunto de signos y síntomas caracterizado por la obstrucción transitoria y reversible del flujo aéreos en los bronquios, generalmente debido a la inflamación, espasmo del músculo liso bronquial y aumento de secreciones. Se manifiesta con sibilancias, disnea, tos y dificultad respiratoria. En la semana S.E. 24 se presentaron 06 casos, con un acumulado de 118 casos con una tasa de incidencia acumulada de 5.84 x cada 1000 menores de 5 años, siendo Yurimaguas el distrito donde se presentan más casos.

El número de episodios de SOB/ASMA en lo que va del año, presenta un Incremento de 22% (21) los casos a lo reportado en el mismo periodo del año 2024.


**Tabla N° 11. Casos de SOBA en menores de 5 años, 2024-2025.**

Distritos	Semanas epidemiológicas SE N° 24						Variación 2024 - 2025	Comportamiento del año 2025 en relación al 2024		
	2024			2025						
	Nº Episodios SE 24	Acumulado	TIA (1000 Hab)	Nº Episodios SE 24	Acumulado	TIA (1000 Hab)				
Balsapuerto	0	7	3.21	0	0	0.00	-7	DISMINUCIÓN		
Jeberos	0	0	0.00	1	1	0.86	1	INCREMENTO		
Lagunas	1	5	2.86	0	1	0.61	-4	DISMINUCIÓN		
Santa Cruz	0	1	1.85	0	1	1.38	0	SIN VARIACIÓN		
Trte. Cesar López Rojas	0	1	1.21	0	1	1.28	0	SIN VARIACIÓN		
Yurimaguas	1	83	9.01	5	114	9.91	31	INCREMENTO		
<b>Total Alto Amazonas</b>	<b>2</b>	<b>97</b>	<b>6.40</b>	<b>6</b>	<b>118</b>	<b>5.84</b>	<b>21</b>	<b>INCREMENTO</b>		

Fuente: NotiWeb-IRA

Elaborado: Área de Epidemiología-DIREDSAA

**Figura N° 24. Episodios de SOB/ASMA por grupos de edad en la Provincia de Alto Amazonas, 2025.**




Fuente: NotiWeb-IRA

Elaborado: Área de Epidemiología \*Hasta S.E. N° 24

La mayoría de casos presentados corresponden al grupo de edad de < 2 meses con 80% (94 casos) y 2-4 años con 20% (24 casos).

**Figura N° 25. Canal endémico de episodios de SOB/ASMA en la Provincia de Alto Amazonas, 2025.**



Fuente: NotiWeb-IRA

Elaborado: Área de Epidemiología\*Hasta S.E. N° 24

Según el canal endémico provincial nos encontramos en **ZONA de ALARMA** en esta semana del año. Es importante el monitoreo para prevenir brotes y tomar medidas oportunas en caso de aumento de casos.

### 3.3 VARICELA (B019)

La varicela es una enfermedad causada por el virus de la varicela-zóster. Causa un sarpullido con picazón y pequeñas ampollas con líquido. La varicela se contagia muy fácil a personas que no han tenido la enfermedad antes o no se han vacunado. Solía ser un problema generalizado, pero, en la actualidad, la vacuna protege a los niños de contraerla.

Hasta la SE N° 24 de este año, se notifica casos 26 casos de varicela sin complicación, con una incidencia acumulada TIA 0.16 X 1000 hab. (Tabla N° 12).


**Tabla N°12. Casos de Varicela, 2024-2025.**

Años Clasificación Distritos/ Tipos de Dx	Pob.2025	2024				2025			
		Vcc	Vsc	T	IA	Vcc	Vsc	T	IA
Balsapuerto	25836	0	26	26	<b>1.42</b>	0	15	15	<b>0.58</b>
Jeberos	6897	0	0	0	<b>0.00</b>	0	0	0	<b>0.00</b>
Lagunas	15117	0	11	11	<b>0.75</b>	0	0	0	<b>0.00</b>
Santa Cruz	5383	0	3	3	<b>0.66</b>	0	1	1	<b>0.19</b>
Teniente Cesar López. R.	7064	0	2	2	<b>0.29</b>	0	0	0	<b>0.00</b>
Yurimaguas	102474	0	70	68	<b>0.88</b>	0	10	0	<b>0.00</b>
<b>Total provincial</b>	<b>162771</b>	<b>0</b>	<b>112</b>	<b>112</b>	<b>0.88</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>0.16</b>

Fuente: NotiWeb-Individual


Elaborado: Área de Epidemiología-DIREDSAA

**Figura N° 26. Casos de Varicela por grupos de edad en la Provincia de Alto Amazonas, 2025.**



Fuente: NotiWeb-Individual  
Elaborado: Área de Epidemiología-DIREDSA

**Figura N° 27. Casos de Varicela, en la Provincia de Alto Amazonas, 2017- 2025.**



Fuente: NotiWeb-Individual  
Elaborado: Área de Epidemiología-DIREDSA

La mayoría de casos corresponden a la etapa de vida niño (0-11 años) con 73% (19 casos), seguido adulto joven (18 -29 años) con el 4% (1 caso), etapa adolescente (12-17 años) con 15% (04 casos) y etapa adulta (30-59 años) con 8% (2 casos) (Figura N° 26).

### 3.5 SÍFILIS (A58)

Sífilis es un problema de salud pública importante a nivel mundial. Es una infección bacteriana causada por **Treponema pallidum** que da lugar a una morbilidad y mortalidad sustanciales. Se trata de una infección de transmisión sexual (ITS) que generalmente se transmite por el contacto con úlceras infecciosas presentes en los genitales, el ano, el recto, los labios o la boca; por medio de las transfusiones de sangre, o mediante la transmisión materna infantil durante el embarazo.

#### 3.5.1 SÍFILIS NO ESPECIFICADA (A51).


La sífilis es una infección sistémica producida por el Treponema Pallidum, se transmite por vía sexual, tanto por sexo oral, vaginal o anal, con una infectividad de alrededor del 30%. En este año 2025 la Provincia de Alto Amazonas hasta la S.E. N° 24, se notificaron 28 casos de Sífilis no Especificada con una tasa de incidencia acumulada (IA) 0.19 X 1000 hab.

**Tabla N° 13. Casos de Sífilis no especificada, 2024-2025.**

Distritos/ Años	POB > 12 + años 2025	2024			2025		
		Casos	F	TIA	Casos	F	TIA
<b>Balsapuerto</b>	<b>21466</b>	0	0	0.00	1	0	0.05
<b>Jeberos</b>	<b>5976</b>	4	0	1.03	2	0	0.33
<b>Lagunas</b>	<b>13573</b>	1	0	0.10	2	0	0.15
<b>Santa Cruz</b>	<b>4820</b>	0	0	0.00	0	0	0.00
<b>Teniente Cesar López. R.</b>	<b>6426</b>	2	0	0.40	0	0	0.00
<b>Yurimaguas</b>	<b>91340</b>	44	0	0.80	23	0	0.25
<b>Total provincial</b>	<b>143601</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	<b>0.56</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>0.19</b>

Fuente: NotiWeb-Individual  
Elaborado: Área de Epidemiología-DIREDSA


**Figura N° 28. Casos de Sífilis no Especificada por grupos de edad en la Provincia de Alto Amazonas, 2025.**



Fuente: NotiWeb-Individual

Elaborado: Área de Epidemiología\*Hasta S.E. N° 24

**Figura N° 29. Casos de Sífilis no Especificada en la Provincia de Alto Amazonas, 2021- 2025.**



Fuente: NotiWeb-Individual

Elaborado: Área de Epidemiología\*Hasta S.E. N° 24

La mayoría de casos corresponde a la etapa de vida Adulto Joven (18-29 años) con 36% (10 casos), seguido del adulto (30 - 59 años) con 46% (13 casos), Adolescentes (12 -17 años) con el 7% (2 casos) y adulto Mayor (>60 años) con el 11% (3 casos), (fig. 28) se observa una disminución inicial en 2022, seguida de un repunte en 2023 y 2024. En 2025 hay una disminución de casos. Por lo que se insta a realizar actividades de promoción y prevención. (fig. 29).

### 3.5.2 SÍFILIS MATERNA (O98.1)

La Sífilis Materna es una infección que aumenta durante la segunda mitad del embarazo y si no es tratada se asocia a un riesgo significativo de aborto, muerte fetal, parto prematuro, muerte perinatal, así como otros trastornos y secuelas con afectación de diversos órganos y marcado deterioro de la calidad de vida de los niños que nacen vivo.


En este año 2025 la Provincia de Alto Amazonas hasta la S.E. N° 25 notifica 11 casos de sífilis materna, con una tasa de incidencia acumulada (TIA) 1.35 comparando con el mismo período del año 2024 (30 casos). La incidencia acumulada a nivel del distrito de Yurimaguas es de 1.83 casos por cada 1000 habitantes.

**Tabla N° 14. Casos de Sífilis Materna, 2024-2025\***

Distritos/ Años	Gestantes 2025	2024			2025		
		Casos	F	TIA	Casos	F	TIA
Balsapuerto	2166	0	0	0.00	1	0	0.46
Jeberos	1105	1	0	5.00	0	0	0.00
Lagunas	607	3	0	5.53	2	0	3.29
Santa Cruz	224	0	0	0.00	0	0	0.00
Teniente Cesar López. R.	246	0	0	0.00	1	0	4.07
Yurimaguas	3829	26	0	9.09	7	0	1.83
<b>Total provincial</b>	<b>8177</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>6.38</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>1.35</b>


Fuente: Área de Epidemiología-DIREDSAA

**Figura N° 30. Casos de Sífilis Materna por grupos de edad en la Provincia de Alto Amazonas, 2025.**



Fuente: Unidad de Epidemiología\*Hasta S.E. N° 24

**Figura N° 31. Casos de Sífilis Materna en la Provincia de Alto Amazonas, 2021-2025.**



Fuente: Unidad de Epidemiología\*Hasta S.E. N° 24

La mayoría de los casos de sífilis afecta al grupo de edad de adultas jóvenes (18-29) con el 11% (01 caso), seguido de mujeres adultas (30-49) con 78% (7 casos) y Adolescentes (12-17) con el 11% (01 caso). (fig. 30). El comportamiento de la enfermedad muestra variaciones, con un pico en 2022 y un descenso en los años siguientes. (fig. 31).

### 3.6 TUBERCULOSIS (A15, A18)

La tuberculosis (TBC) es una enfermedad infecciosa que suele afectar principalmente a los pulmones y es causada por una bacteria (Mycobacterium tuberculosis). Se transmite de una persona a otra a través de gotitas de aerosol suspendidas en el aire expulsado por personas con enfermedad pulmonar activa. El síntoma principal de la tuberculosis pulmonar activa es tos, a veces con flema que puede ser sanguinolento, dolor torácico, debilidad, pérdida de peso, fiebre y sudoración nocturna.


Hasta la SE N° 24 de este año, se notifica 67 casos de TBC con una incidencia acumulada TIA 1.02 X 1000 hab. De las cuales casos son 50 casos de TBC Pulmonar y 17 casos de TBC Extrapulmonar. (Tabla N° 15).

**Tabla N°15. Casos de Tuberculosis, 2023-2024.**

Distritos	2024	F	2025	F	IA
<b>Balsapuerto</b>	15	2	6	2	<b>0.99</b>
<b>Jeberos</b>	5	2	1	0	<b>0.18</b>
<b>Lagunas</b>	6	2	2	0	<b>0.48</b>
<b>Santa Cruz</b>	3	1	0	0	<b>0.22</b>
<b>Teniente Cesar López. R.</b>	8	0	0	0	<b>0.43</b>
<b>Yurimaguas</b>	136	23	58	6	<b>1.30</b>
<b>TOTAL</b>	<b>173</b>	<b>30</b>	<b>67</b>	<b>8</b>	<b>1.02</b>


Fuente: Área de Epidemiología-DIREDSAA

**Figura N° 32. Casos de TBC por grupos de edad en la Provincia de Alto Amazonas, 2025.**



Fuente: Unidad de Epidemiología\*Hasta S.E. N°24

**Figura N° 33. Casos de Tuberculosis, en la Provincia de Alto Amazonas, 2021- 2025.**



Fuente: Unidad de Epidemiología\*Hasta S.E. N°24

La mayoría de casos corresponden a la etapa de vida adulto (30-59 años) con 40% (27 casos), seguido del adulto mayor (>60 años) con 23% (15 casos), adulto joven (18 -29 años) con el 28% (19 casos), etapa adolescente (12-17 años) con 9% (6 casos) y etapa de vida niño-niña (5-11 años) con 0% (0 casos) (Figura N°32). Nos muestra un incremento sostenido hasta el 2024, seguido de una reducción en 2025. (fig. 33).

### 3.7 HEPATITIS B. (B16)

**Hepatitis.** Son un grupo de enfermedades caracterizadas por producir inflamación del hígado. La infección por estos virus eleva las transaminasas y sólo en algunos casos aparecen síntomas. La **hepatitis B** se transmite por contacto con sangre (transfusiones, drogadicción) o vertical (de madre a hijo durante el embarazo o el parto). También se puede transmitir por contacto sexual. No suele producir síntomas y se puede volver crónica. La hepatitis B aguda se cura en un 90% de los casos, pero el 10% restante evoluciona hacia una hepatitis crónica.


Hasta la Semana Epidemiológica (SE) 24 - 2025, se notifica 13 casos de Hepatitis B a nivel provincial, reportándose un incremento de 85% (6) casos que el año 2024 en el mismo período. (Tabla N° 16).

**Tabla N° 16. Casos de Hepatitis B, 2024-2025.**

Años Distritos / Tipo de DX	Población 2025	2024						2025					
		C	D	P	F	T	TIA	C	D	P	F	T	TIA
Balsapuerto	25836	1	0	0	0	1	0.05	0	0	1	0	1	0.04
Jeberos	6897	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00
Lagunas	15117	1	0	1	0	2	0.14	0	0	0	0	0	0.00
Santa Cruz	5383	0	0	1	0	1	0.22	0	0	0	0	0	0.00
Teniente Cesar López. R.	7064	0	0	0	0	0	0.00	0	0	2	0	2	0.28
Yurimaguas	102474	3	0	0	0	3	0.04	0	0	10	0	10	0.10
<b>Total provincial</b>	<b>162771</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>0.06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>0.08</b>


Fuente: Área de Epidemiología-DIREDSA.

**Figura N° 34. Casos de Hepatitis B por grupos de edad en la Provincia de Alto Amazonas, 2025.**



Fuente: Unidad de Epidemiología\*Hasta S.E. N° 24

**Figura N° 35. casos de Hepatitis B, en la Provincia de Alto Amazonas, 2020- 2025.**



Fuente: Unidad de Epidemiología\*Hasta S.E. N° 24


La mayoría de los casos corresponde a la etapa de vida adulto (30 -59 años) con el 62% (8 casos), etapa adolescente (12-17 años) con 15% (2 casos), adulto mayor (60+) con 23% (3 casos), adulto Joven (18-29 años) con 0% (0 casos) y etapa de vida niño-niña (0-11 años) con 0% (0 casos) y. Por lo que se insta a realizar actividades de promoción y prevención.

#### **IV. VIGILANCIA DE DAÑOS NO TRANSMISIBLE**

##### **4.1 VIGILANCIA DE LESIONES DE ACCIDENTES DE TRANSITO**

Es el que ocurre sobre la vía y se presenta súbita e inesperadamente, determinado por condiciones y actos irresponsables potencialmente previsibles, atribuidos a factores humanos, vehículos preponderantemente automotores, condiciones climatológicas, señalización y caminos, los cuales ocasionan pérdidas prematuras de vidas humanas y/o lesiones, así como secuelas físicas o psicológicas, perjuicios materiales y daños a terceros.


**Figura N° 36. Casos de accidentes de tránsito atendidos por grupos de edad, en la Provincia de Alto Amazonas, 2025.**



Fuente: Notiweb-Acctran  
Elaborado: Epidemiología DRSA

La mayoría de casos corresponden a la etapa de vida adulto (30-59 años) con 35%, seguido adulto joven (18 - 29 años) con el 39% y adolescentes (12-17) con el 13%, etapa vida niño-niña (0-11 años) con 8% y adulto mayor (>60 años) con 5%, (Figura N° 34).

**Figura N° 37. Casos de accidentes de tránsito, Provincia de Alto Amazonas 2020- 2025.**



Fuente: Notiweb-Acctran  
Elaborado: Epidemiología DRSAA

**Figura N° 38. Casos de Accidentes de Tránsito por lugar de Ocurrencia- 2025.**


Calles y/o Avenidas	Casos	% Casos	Calles y/o Avenidas	Casos	% Casos
15 de Agosto	35	14.5	Grau	2	0.8
Libertad	25	10.4	AAHH Buena Vista	2	0.8
Vía de evitamiento	24	10.0	Km. 21 Mariano	1	0.4
Carretera Ygs-Tarapoto	21	8.7	AAHH Filadelfia	1	0.4
Las Américas	15	6.2	16 de Agosto	1	0.4
Carretera Munichis	9	3.7	Garcilazo	1	0.4
Zamora	8	3.3	Carretera San Rafael	1	0.4
Jose Riera	7	2.9	Bolognesi	1	0.4
Victor Sifuentes	6	2.5	Moto Cross	1	0.4
Circunvalación carret.	6	2.5	Luis Ibarra	1	0.4
Iquitos	5	2.1	Aviacion	1	0.4
Alfonso Ugarte	5	2.1	Progreso	1	0.4
Tacna	5	2.1	Jorge Chavez	1	0.4
Angamos	4	1.7	Julio C Arana	1	0.4
Comercio	3	1.2	Jose Galvez	1	0.4
Km. 30 Santo Tomas	3	1.2	AAHH LA Ramada	1	0.4
Arica	3	1.2	28 de Julio	1	0.4
Mi Peru	3	1.2	AAHH Independencia	1	0.4
AAHH Violeta Correa	3	1.2	PPJJ 82	1	0.4
Aguirre	3	1.2	Munichis	1	0.4
Mcal. Castilla	3	1.2	Jauregui	1	0.4
Fco. Bardalez	3	1.2	AAHH Pijuyal	1	0.4
Condamine	3	1.2	San Martin	1	0.4
Ucayali	3	1.2	(en blanco)	1	0.4
AAHH San Juan	2	0.8	Total	241	100
Psje. La Loma	2	0.8			
Mcal. Caceres	2	0.8			
Maynas	2	0.8			
AAHH Los Maderos	2	0.8			

Los casos de accidente de tránsito en este año 2025 hasta la S.E 23 hay 241 casos.

#### 4.2. VIGILANCIA DE DIABETES

La diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce. La insulina es una hormona que regula el azúcar en la sangre. El efecto de la diabetes no controlada es la hiperglucemia (aumento del azúcar en la sangre), que con el tiempo daña gravemente muchos órganos y sistemas, especialmente los nervios y los vasos sanguíneos. Tipos de Diabetes tipo 1, Diabetes Tipo 2, Diabetes gestacional.


**Figura N°39. Casos de Diabetes por grupos de edad, en la Provincia de Alto Amazonas,2025.**



Fuente: Notiweb-Vig. Diabetes  
Elaborado: Epidemiología DRSAA

La mayoría de casos corresponden a la etapa de vida adulto (30-59 años) con 61%, seguido del adulto mayor (>60 años) con 36%, adulto joven (18 -29 años) con el 3% y adolescentes (12-17) con el 3% (Figura N° 39).


**Figura N° 40. Casos de Diabetes, por Ipress, provincia de Alto Amazonas 2024-2025 (SEM 24).**



Fuente: Notiweb-Diabetis- Área de Epidemiología DIREDSA

La mayoría de Los casos de diabetes corresponde al Hospital Santa Gema, seguido por Ipress Lagunas, Independencia, Pampa Hermosa,


**Figura N° 41. Casos de Diabetes notificados vs seguimiento, por Ipress, Provincia de Alto Amazonas 2019-2025 (SEM 24).**



Fuente: Notiweb -Diabetis-Área de Epidemiología-DIREDSA

Carretera, Jeberos, Balsapuerto, Santa María, Grau, Villa del Paranapura. Shucushyacu.


**Figura N° 42. Casos de Diabetes, según tipo de Diabetes, Provincia de Alto Amazonas 2025 (sem 24).**



Fuente: Notiweb-Diabetis-Área de Epidemiología-DIREDSA

La mayoría de Los casos de diabetes corresponde a Diabetes Tipo 2 con un 98%, Diabetes tipo 2 con un 0%, Diabetes Gestacional con 0% (Figura N° 42).

**Figura N° 43. Tipos de Diabetes según atención, Provincia de Alto Amazonas, año 2025 (Sem. 24).**




Fuente: Notiweb-Diabetes-Área de Epidemiología-DIREDSA

#### 4.3. VIGILANCIA DE VIOLENCIA FAMILIAR

La violencia en la familia, principalmente, la cometida contra la mujer, y especialmente la ejercida por su pareja y la violencia sexual, constituye un grave problema de salud pública y una violación de los derechos humanos de las mujeres. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), se estiman que una de cada tres mujeres en el mundo sufre de violencia física y/o sexual de pareja o violencia sexual por terceros en algún momento de su vida. La mayoría de estos casos son violencia infligida por la pareja.


Hasta la S.E 24 la Provincia de Alto Amazonas presentan 138 casos notificados.

**Figura N° 44. Casos de Violencia Familiar en la Provincia de Alto Amazonas, 2021 -2025 (SEM 24).**



Fuente: Notiweb-viol. Fam.  
Elaborado: Epidemiología DRSAA


**Figura N° 45. Casos de Violencia Familiar, por Distritos, Provincia de Alto Amazonas. 2021-2025 (SEM. 24).**



Fuente: Notiweb-viol. Fam.  
Elaborado: Epidemiología DRSAA

La mayoría de Los casos de Violencia Familiar corresponde a la Micro Red de Yurimaguas, seguido de Lagunas, Balsapuerto, y Tnte. Cesar López. (Figura N° 45).


**Figura N° 46. Casos de Violencia Familiar, por etapas de vida del agredido(o), Provincia de Alto Amazonas, 2025, (SEM. 24).**



Fuente: Notiweb-viol. Fam.  
Elaborado: Epidemiología DRSAA

La mayoría de casos corresponden a la etapa de vida adulto (30-59 años) con 46%, seguido del adulto mayor (>60 años) con 4%, adulto joven (18 -29 años), con el 36%, adolescentes (12-17) con el 10% y niño-niña (0-11 años) con 4%.


**Figura N° 47. Tipos de Violencia Familiar, Provincia de Alto Amazonas 2025.**



Fuente: Notiweb-viol. Fam.  
Elaborado: Epidemiología DRSAA

La mayoría de Los casos de Violencia son Psicológica con 61%, seguido de violencia física con 31%, violencia sexual con 7% y abandono con 1% (Figura N° 47).

**Figura N° 48. Violencia Familiar, según estado del agresor(a), Provincia de Alto Amazonas, año 2025.**



Fuente: Notiweb-viol. Fam.  
Elaborado: Epidemiología DRSAA


#### **4.4 Vigilancia de Salud Mental**

Se implica la promoción del bienestar, la prevención y el control de los problemas de salud mental, se ha implementado y se desarrolla la vigilancia de problemas de la salud mental priorizados en IPRESS centinela (Centro de Salud Mental Comunitario, Hospital Santa Gema II-2, Munichis, Aguamiro y Loma).

##### **4.4.1 Intento de suicidio**


El comportamiento suicida constituye un problema complejo, con múltiples causas interrelacionadas, siendo la enfermedad mental uno de los factores más importante que predispone al comportamiento suicida. Las personas afectadas por enfermedades mentales presentan un riesgo de suicidio diez veces mayor que aquellas personas que no las sufren. Los problemas mentales más a menudo asociados a los comportamientos suicidas son la depresión y los trastornos bipolares, el abuso de drogas y alcohol y la esquizofrenia. El suicidio es la muerte causada por un acto intencional de autolesión que está diseñado para ser mortal. El comportamiento suicida incluye suicidio consumado, intento de suicidio e ideación suicida. Hasta la S.E. 24 se notificaron 17 casos de intento de suicidio, en la Provincia de Alto Amazonas.

**figura N°49. Casos de intento de Suicida en la Provincia de alto Amazonas, 2022-2025.**




Fuente: Área de Epidemiología-DIREDSAA

**Figura N° 50. Casos de intentos de Suicidio por grupos de edad en la Provincia de Alto Amazonas, 2025.**



Fuente: Área de Epidemiología\*Hasta S.E. N°24

**Figura N°51. Antecedentes de intento de suicida 2025.**




Fuente: Área de Epidemiología\*Hasta S.E. N°24

La mayoría de casos corresponden a la etapa de vida adulto Joven (18-29 años) con 61%, etapa adulta (30-59 años) con 28% adolescentes (12-17) con 5%, adulto mayor (>60 años) con 6% y etapa niño (9-11 años) con 0%. (Figura N°51).

#### **4.4.2 VIGILANCIA DEPRESIÓN MODERADA Y GRAVE.**


Los trastornos depresivos se caracterizan por una tristeza de una intensidad o una duración suficiente como para interferir en la funcionalidad y, en ocasiones, por una disminución del interés o del placer despertado por las actividades. Se desconoce la causa exacta, pero probablemente tiene que ver con la herencia, cambios en las concentraciones de neurotransmisores, una alteración en la función neuroendocrina y factores psicosociales. El diagnóstico se basa en la anamnesis. En el tratamiento se utilizan fármacos, psicoterapia o ambos y en ocasiones terapia electroconvulsiva o estimulación magnética transcraneal rápida. Hasta la S.E. 24-2025 se notificaron 85 casos de depresión moderada y grave en este año, en la Provincia de Alto Amazonas.

**Figura N°52. Casos de depresión moderada y grave, por IPRESS, provincia de Alto Amazonas, años 2021-2025.**




Fuente: Área de Epidemiología-DIREDSAA

**Figura N° 53. Casos de Depresión por grupos de edad en la Provincia de Alto Amazonas, 2025.**



Fuente: Área de Epidemiología\*Hasta S.E. N°24

**Figura N° 54. Casos de Depresión por IPRESS, Provincia Alto Amazonas, 2023-2025.**



Fuente: Unidad de Epidemiología\*Hasta S.E. N°24

La mayoría de casos corresponden a la etapa de vida adulto Joven (18-29 años) con 26%, adolescentes (12-17) con el 5%, etapa adulta (30-59 años) con 56%, adulto mayor (>60 años) con 12% y etapa niño (0-11 años) con 1%. (Figura N°53).

#### **4.4.3 VIGILANCIA EPISODIO PSICÓTICO.**

Los trastornos psicóticos son trastornos mentales graves que causan ideas y percepciones anormales. Las personas con psicosis pierden el contacto con la realidad. Dos de los síntomas principales son delirios y alucinaciones. Los delirios son falsas creencias, tales como la idea de que alguien está en su contra o que la televisión les envía mensajes secretos. Las alucinaciones son percepciones falsas, como escuchar, ver o sentir algo que no existe.


Hasta la S.E. 24 se notificaron 26 casos de episodio psicótico en este año, en la Provincia de Alto Amazonas.

**Tabla N°17. Casos de episodio psicótico, por IPRESS, provincia de Alto Amazonas, años 2021-2025.**

IPRESS	2021	2022	2023	2024	2025	Total
<b>C.S.M.C YURIMAGUAS</b>	5	9	19	20	1	54
<b>LA LOMA</b>	0	1	0	0	0	1
<b>HOSPITAL SANTA GEMA</b>	0	1	17	57	25	100
<b>Total</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>36</b>	<b>77</b>	<b>26</b>	<b>155</b>

Fuente: Área de Epidemiología-DIREDSAA

**Figura N° 55. Casos de Episodio Psicótico por grupo etario en la Provincia de Alto Amazonas, 2025.**



Fuente: Unidad de Epidemiología\*Hasta S.E. N°24

La mayoría de casos corresponden al sexo Femenino con 65 % y sexo Masculino con 35% (Figura N°55).

**Figura N° 56. Casos de Episodios Psicóticos por Meses, Provincia Alto Amazonas, 2021-2025.**

Meses	2021	2022	2023	2024	2025	Total
Ene	0	0	0	3	8	11
Feb	0	2	1	5	7	15
Mar	0	2	3	5	4	14
Abr	0	0	3	6	4	13
May	0	1	3	2	3	9
Jun	0	1	1	20		22
Jul	0	2	3	13		18
Ago	4	2	5	6		17
Sep	1	0	4	0		5
Oct	0	1	8	3		12
Nov	0	0	0	2		2
Dic	0	0	5	12		17
<b>Total</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>36</b>	<b>77</b>	<b>26</b>	<b>155</b>

Fuente: Unidad de Epidemiología\*Hasta S.E. N°24

#### 4.4.4 VIGILANCIA POR INTOXICACIÓN POR PLAQUICIDAS


La implementación de esta vigilancia epidemiológica en el país, tiene como finalidad de contribuir en la prevención y control de la exposición e intoxicación por plaguicidas en la población del Perú. El objetivo es el de estandarizar la metodología de la vigilancia y establecer la oportunidad detección de situaciones de alerta y brotes y establecer mecanismos de articulación intersectorial para la vigilancia epidemiológica en salud pública del riesgo por exposición e intoxicación por plaguicidas. Hasta la S.E. 24 se notificaron 04 casos por intoxicación por plaguicidas en este año, en la Provincia de Alto Amazonas.

**Tabla N°18. Casos de intoxicación por plaguicidas según IPRESS, provincia de Alto Amazonas, años 2024-2025.**

IPRESS	2024	2025	%
Hospital Santa Gema	4	2	<b>50.0</b>
Pampa Hermosa	5	0	<b>0.0</b>
Providencia	1	0	<b>0.0</b>
Santa María	0	1	<b>25.0</b>
Lagunas	0	1	<b>25.0</b>
<b>Total</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>100</b>

Fuente: Área de Epidemiología-DIREDSAA


**Figura N° 57. Casos de intoxicación por plaguicidas, por grupo etáreo, provincia Alto Amazonas, año 2025.**



Fuente: Unidad de Epidemiología\*Hasta S.E. N°24

La mayoría de casos corresponden a la etapa de vida niño-niña (0-11 años) con 25%, seguido por la etapa adulto joven (18-29 años) con 25% etapa adulto mayor (60 a+) con 50%, adulto (30-59 años) con 0%, y etapa Adolescentes (12-17 años) con 0% (Figura N°57).

**Figura N° 58. Casos de intoxicación por plaguicidas según signos y síntomas, Provincia Alto Amazonas, 2025.**



Fuente: Unidad de Epidemiología\*Hasta S.E. N 24

## V. MORTALIDAD POR TODAS LAS CAUSAS.

Las causas principales de defunción en el mundo, con arreglo al número total de vidas perdidas, se atribuyen a tres grandes cuestiones: las enfermedades cardiovasculares (cardiopatías isquémicas, accidentes cerebrovasculares), las enfermedades respiratorias (enfermedad pulmonar obstructiva crónica, infecciones de las vías respiratorias inferiores) y las afecciones neonatales, que engloban la asfixia y el traumatismo en el nacimiento, la septicemia e infecciones neonatales y las complicaciones del parto prematuro. Las causas de Mortalidad pueden agruparse en tres categorías: enfermedades transmisibles (enfermedades infecciosas y parasitarias y afecciones maternas, perinatales y nutricionales), enfermedades no transmisibles (crónicas) y lesiones.

**Tabla N°19. Las principales causas de mortalidad en la Provincia de Alto Amazonas notificadas en la S.E (24) 2024-2025.**

causas	Año		Total general
	2024	2025	
INFECCION POR VIH		1	1
INSUFICIENCIA RENAL CRONICA	1		1
INSUFICIENCIA RENAL CONICA	1		1
HIPERTENSION ARTERIAL ESENCIAL		1	1
MARASMO NUTRICIONAL		1	1
OTRAS ENFERMEDADES PULOMANR INTERSTICIAL CON FIBROSIS		1	1
<b>Total general</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>

Fuente: Área de Epidemiología-DIREDSAA.

**Tabla N°20. Las principales causas de mortalidad en la Provincia de Alto Amazonas notificadas en la S.E 24-2025.**

Causas	Distritos	Total
	YURIMAGUAS	
INFECCION POR VIH	1	1
HIPERTENSION ARTERIAL ESENCIAL	1	1
MARASMO NUTRICIONAL	1	1
OTRAS ENFERMEDADES PULOMANR INTERSTICIAL CON FIBROSIS	1	1
<b>ALTO AMAZONAS</b>	<b>4</b>	<b>4</b>

Fuente: Área de Epidemiología-DIREDSAA

## **Epidemiológico.**

El Boletín Epidemiológico, es la publicación oficial del Área de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, de la Red de Salud de Alto Amazonas. El Boletín, se edita semanalmente a cargo del equipo de la oficina de Epidemiología - DRSAA.

El Boletín Epidemiológico, publica la situación o tendencias de las enfermedades o eventos sujetos a notificación obligatoria, las normas acerca de la vigilancia epidemiológica en salud pública en el Perú, los informes técnicos de brotes y otras emergencias sanitarias, resúmenes de trabajos de investigación desarrollados por el personal de la Red de salud de Alto Amazonas, el Área de Epidemiología y otras informaciones de interés para el personal de salud.

Título:

Boletín Epidemiológico Semanal.

Correo electrónico

[Epide160201@yahoo.com](mailto:Epide160201@yahoo.com)

Web

[www.epi.diredsaa.gob.pe](http://www.epi.diredsaa.gob.pe)

La información del presente Boletín Epidemiológico procede de la notificación de 106 establecimientos de salud. La información contenida en la sección de tendencia del boletín es actualizada cada semana o mes. Los datos y análisis son provisionales y pueden estar sujetos a modificación. Esta información es suministrada semanalmente por la Red de Salud de Alto Amazonas el Área de Epidemiología.

Obst. Percy Sanchez Vergaray.  
Director de la Red de Salud A.A

Obst. Jhon James Valles Pérez.  
Sub director de la Red de Salud A.A

Lic. Enf. Nelly Lizeth Escobar Ramos.  
Área de Epidemiología DRSAA.

### **Equipo Técnico:**



Lic. Enf. Marleny B. Muñoz Quispirina.

C.D. Daniel Barrutia Araujo.

Blgo. Karen Inés Huamán Silva.

Tec. Enf. Ana A. Peltroche Córdova.

Tec. Enf. Lester Vela Tello.

Tec. Enf. Cesia K. Saavedra Shapiama.

Tec. Enf. Segundo Rosbel Soria Saavedra.

