



GERESA
CENTRO REGIONAL DE SALUD DE LORETO

RED INTEGRADA DE SALUD ALTO AMAZONAS
BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO SEMANAL
ÁREA DE EPIDEMIOLOGÍA



“Día Mundial contra la Hepatitis”.

El 28 de julio, la Organización Mundial de la Salud (OMS) celebra el **Día Mundial contra la Hepatitis**, una inflamación grave del hígado que causa daño hepático y cáncer de hígado. En las Américas, **10 millones de personas** viven con hepatitis B o C crónica. Aunque la hepatitis C es curable, **solo el 26% de los casos diagnosticados** han accedido al tratamiento en América Latina y el Caribe. Solo el **21% de las personas con hepatitis B** en la región han sido diagnosticadas, y apenas el **4,4% reciben tratamiento**. Cada año, en las Américas se registran más de **8 mil nuevas infecciones** por hepatitis B y 20 mil muertes, y 176 mil nuevas infecciones por hepatitis C, con aproximadamente 38 mil muertes asociadas. Si no se toman medidas urgentes, se estima que para 2040 la hepatitis viral **causará más muertes al año en el mundo** que la malaria, la tuberculosis y el VIH/sidas combinados.

El Día Mundial contra la Hepatitis busca crear conciencia sobre la hepatitis vírica, una enfermedad que puede causar daños graves al hígado y cáncer. El lema es: **“Hepatitis: conozcámolas para combatirla”** y destaca la urgencia de eliminar barreras como el estigma y mejorar el acceso a diagnóstico y tratamiento. Aunque las hepatitis B y C son prevenibles, tratables y, en el caso de la C, curables, siguen causando daños sin ser detectadas. La campaña llama a integrar los servicios de hepatitis en los sistemas de salud para eliminar esta amenaza antes de 2030. La hepatitis vírica es una infección que produce una **inflamación aguda en el hígado**. Existen 5 virus diferentes de la hepatitis, cada uno catalogado con una letra del alfabeto diferente y mientras más alejado de la A se encuentre mayor es el riesgo que acarrea la infección. En la mayoría de los casos, la inflamación del hígado comienza de forma súbita y solo dura unas pocas semanas. La forma más común de contraer esta enfermedad, es insertando en nuestro cuerpo algún objeto contaminado con sangre de alguien que ya posee el virus, cosa que ocurre mucho en personas que se tatúan, se hacen piercing en el cuerpo, tienen varias parejas sexuales o comparten agujas para inyectarse drogas o cualquier otra sustancia en el cuerpo.

Director de la Red de Salud

Obst. Percy Sanchez Vergaray.

Área de Epidemiología.

Lic. Enf. Nelly L. Escobar Ramos.

Equipo Técnico:

Lic. Enf. Marleny B. Muñoz Quispirina.

C.D. Daniel A. Barrutia Araujo.

Blgo. Karen Huaman Silva

Tec. Enf. Ana A Peltroche Córdova.

Tec. Enf. Léster Lenin Vela Tello.

Tec. Enf. Cesia K. Saavedra Shapiama.

Email: epide160201@yahoo.com

Web: www.epi.diredsa.gob.pe

DAÑOS NOTIFICADOS EN LA SEMANA

Infecciones respiratorias agudas	217
EDA acuosa	124
Dengue sin señales de alarma	38
Neumonía <5 años	09
Leptospirosis	08
SOB/ASMA	06
VIH/SIDA	05
Ofidismo	04
Dengue con Señales de Alarma	02
Malaria por p. Vivax	02
Loxocelismo	01
Sifilis N/E	01
Dengue Grave	01
Leishmaniasis cutánea	00
Eda Disentérica	00
Hepatitis B	00
Sifilis Materna	00

SITUACIÓN DE SALUD**I.- ENFERMEDADES TRASMITIDAS POR VECTORES****1.1.- MALARIA POR PLASMODIUM VIVAX Y FALCIPARUM**

El año 2025 hasta la S.E. 31 se ha notificado a nivel Provincial 75 casos de Malaria, con un promedio semanal de 02 casos, Tasa de incidencia acumulada (TIA) de 0.46 por 1000 habitantes. El 100% (75) de los casos corresponde a Plasmodium Vivax y el 0% (0 casos) a Plasmodium Falciparum.

El Distrito de Balsapuerto reporta la mayor incidencia de casos 1.39 por 1000 habitantes de los casos de Malaria en la provincia de Alto Amazonas.

En la Semana Epidemiológica (SE) 31- 2025, no se notificó casos de malaria a nivel provincial, reportándose una Disminución del 79 % (275) casos que el año 2024 en el mismo período. Tabla N°01.


Tabla N°01. Casos de malaria por inicio de síntomas, Provincia de Alto Amazonas, 2025 a la (S.E.31)

Distritos	2024				2025				Variación 2024 - 2025	Comportamiento del año 2025 en relación al 2024
	SE-31	Acumulado SE-31	TIA(1000 hab.)	Defunciones	SE-31	Acumulado SE-31	TIA(1000 hab.)	Gestante		
Balsapuerto	9	235	12.85	0	0	36	1.39	0	0	DISMINUCIÓN
Jeberos	0	0	0.00	0	0	7	1.01	0	0	INCREMENTO
Lagunas	0	36	2.45	0	0	2	0.13	0	0	DISMINUCIÓN
Santa Cruz	0	0	0.00	0	0	2	0.37	0	0	INCREMENTO
Tnte. Cesar Lopez Rojas	0	0	0.00	0	0	1	0.14	0	0	INCREMENTO
Yurimaguas	3	79	1.02	0	0	27	0.26	0	0	DISMINUCIÓN
Provincia de Alto Amazonas	12	350	2.75	0	0	75	0.46	0	0	DISMINUCIÓN

Fuente: Notiweb-Individual

Elaborado: Área de Epidemiología-DIREDSAA

Figura N° 01. Canal de casos de malaria en la Provincia de Alto Amazonas – 2025 a la S.E. 31.




Fuente: Notiweb-Individual

Elaborado: Área de Epidemiología-DIREDSAA

El canal endémico provincial para Malaria muestra; en la semana 03 tenemos un leve ingreso a **zona de alarma**, semanas posteriores hasta la actualidad continuamos en **zona de éxito**. Por lo que es necesario adoptar medidas de control de manera inmediata en las localidades afectadas. La situación de esta semana epidemiológica posiblemente responde a los habituales retrasos en la notificación. (Figura N° 01).

Figura N°02. Casos de Malaria, Provincia de Alto Amazonas 2014-2025.



Fuente: Notiweb-Individual

Elaborado: Área de Epidemiología-DIREDSA

Según la curva epidemiológica, que desde el año **2014 al 2018** la tendencia fue al incremento; sin embargo, en los años 2019-2021 se redujo el número de casos en un 78.8%. Entre los años 2022-2023 los casos se acrecentaron en un 61.5%, en comparación al año anterior; en **2024** se observa una evidente reducción de casos con **72.1%** en relación al año **2023**; lo que va del presente año, tenemos notificados **75** casos de malaria Vivax hasta la S.E 31 lo que representa una TIA de 0.46 x1000 hab.


Figura N° 04. Mapa de Riesgo, Provincia de Alto Amazonas, 2025.



Fuente: Notiweb-Individual

Elaborado: Área de Epidemiología-DIREDSA

Figura N° 03. Casos de Malaria por grupo de edades Provincia de Alto Amazonas 2025.



Fuente: Notiweb-Individual

Elaborado: Área de Epidemiología-DIREDSA

La mayoría de casos corresponde a la etapa de vida niña-niña (0-11 años), con 38% (28 casos), seguido por etapa adolescentes (12 -17 años) con el 25% (19 casos), Adulto (30-59 años) con 13% (10 casos), de Adulto joven (18 - 29 años) con 21% (16 casos), Adulto Mayor (>60) con 3% (02 casos), y (Figura N°03).

Según nuestra Figura N° 04, la S.E. N° 31 el distrito de Santa Cruz, Lagunas, Tnte. Cesar Lopez Rojas y Yurimaguas, el Distrito de Jeberos y Balsapuerto, se encuentra el Bajo Riesgo. Es necesario continuar con las actividades de prevención y control de esta enfermedad priorizando las localidades que se encuentran en mayor riesgo.

1.2.- DENGUE

El dengue representa un desafío creciente para la salud pública en Perú, intensificado por brotes frecuentes que se ven agravados por la alta densidad poblacional en áreas urbanas y factores ambientales que favorecen la proliferación del mosquito Aedes aegypti, portador del agente causal. El cambio en las condiciones climáticas, incluyendo el aumento de las temperaturas y las variaciones en los patrones de lluvia, ha intensificado este problema.

En este año 2025 la Provincia de Alto Amazonas hasta la S.E. N° 31 notifica 1482 casos de dengue, de estos el 24% (406 casos) son probables y el 73% (1076 casos) son confirmados, Además, se observa un incremento en el número de casos de dengue en comparación con el año 2024. Se ha notificado 02 defunciones en el distrito de Yurimaguas. Según la forma clínica de la enfermedad el 86% (1273) son casos de Dengue sin signos de alarma, 13% (203) casos de Dengue con señales de alarma y 1% (6) Dengue Grave (tabla 2). En cuanto al serotipo del virus del dengue que circulan en la provincia de Alto Amazonas predominan la presencia de 2 serotipos, DEN-2, DEN-3.

Tabla N° 02. Casos de dengue por inicio de síntomas y por distritos de la Provincia de Alto Amazonas 2024-2025.

Distritos	2024					2025					Variación 2024 - 2025	Comportamiento del año 2025 en relación al
	SE 31	Acumulado SE 31	TIA(1000 hab.)	Gestante	Defunciones	SE 31	Acumulado SE 31	TIA(1000 hab.)	Gestante	Defunciones		
Balsapuerto	0	0	0.00	0	0	5	19	0.74	0	0	19	INCREMENTO
Jeberos	0	3	0.55	0	0	0	7	1.01	0	0	4	INCREMENTO
Lagunas	0	176	11.99	0	0	1	104	6.88	0	0	-72	DISMINUCIÓN
Santa cruz	0	0	0.00	0	0	0	25	4.64	0	0	25	INCREMENTO
Tnte. Cesar Lopez Rojas	0	1	0.14	0	0	0	37	5.24	0	0	36	INCREMENTO
Yurimaguas	15	1505	19.45	0	0	21	1290	12.59	5	0	-215	DISMINUCIÓN
Provincia de Alto Amazonas	15	1685	13.24	0	0	27	1482	9.10	5	0	-203	DISMINUCIÓN

Fuente: Notiweb-Individual

Elaborado: Área de Epidemiología-DIREDSA

Figura N° 05. Tendencia semanal de casos de dengue en la Provincia de Alto Amazonas, 2021-2025 hasta S.E 31.




Fuente: Notiweb-Individual

Elaborado: Área de Epidemiología-DIREDSA

La incidencia de casos en el año 2022 fue de 20.80% x 1000 hab., se reportó un acumulado de 2947 casos con 4 fallecidos, en el año 2023 la incidencia fue de 17.49% x1000 hab, se reportó 2201 casos, mientras que en el año 2024 la incidencia fue de 45.21% x 1000 hab, los casos persistieron durante todo el año con un promedio de 86 casos por semana epidemiológica, alcanzando el pico más alto con un acumulado de 4447 casos , en lo que va del año 2025 la incidencia de casos es de 9.% x 1000 hab, hasta la S.E 31 se reportan 1486 casos con 02 fallecidos.

Figura N° 06. Canal endémico de casos de dengue en la Provincia de Alto Amazonas – 2024-2025 hasta S.E. 31.




Fuente: Notiweb-Individual

Elaborado: Área de Epidemiología-DIREDSA

El canal Endémico en el año 2024 hubo un pico epidémico significativo en cierto periodo, mientras que en 2025 los casos prevalecen con una leve disminución y se encuentra **zona de epidemia**. Es importante señalar que este enfoque corresponde a la dinámica de la enfermedad, por lo que resulta imperativo tomarlo con cautela y tener en cuenta que los pronósticos pueden variar con la actualización periódica de datos semanales.

Figura N° 07. Casos de dengue por grupo de edades Provincia de Alto Amazonas 2025.

Etapas de Vida	Femenino	Masculino	TTT	%
Niños (0 - 11 años)	225	255	480	32
Adolescentes (12 - 17 años)	128	128	256	17
Adulto Joven (18 - 29 años)	146	95	241	16
Adulto (30 - 59 años)	237	169	406	27
Adulto Mayor (60 a mas años)	55	44	99	7
Total	791	691	1482	100



Fuente: Notiweb-Individual

Elaborado: Área de Epidemiología-DIREDSA

La mayoría de los casos corresponde a la etapa de vida Adulto (30-59 años) con 27% (406 casos), seguido de vida niña-niña (0-11 años), con 32% (480 casos), seguido de Adulto joven (18 - 29 años) con 16 % (241 casos) por etapa adolescentes (12 -17 años) con el 17% (256 casos) y etapa Adulto Mayor (>60) con 7% (99 casos) (Figura N°07).

II. ENFERMEDADES ZOÓNOTICAS

2.1.- LEPTOSPIROSIS (A27)

La Leptospirosis es una enfermedad Zoonótica causada por la bacteria Leptospira interrogans, que es patógena para los hombres y los animales, con más de 200 variedades serológicas o serovariiedades. La leptospirosis puede presentarse con una amplia variedad de manifestaciones clínicas, desde una forma leve a una enfermedad grave y a veces fatal. Tiene potencial epidémico, generalmente después de lluvias intensas. Sus síntomas pueden parecerse a varias enfermedades, como influenza, dengue y otras enfermedades hemorrágicas de origen viral; es importante el diagnóstico correcto (clínico y de laboratorio) al inicio de los síntomas para evitar casos graves y salvar vidas principalmente en situaciones de brotes, en la S.E. N° 31 no se notificó casos de Leptospirosis, con un Acumulado de 531 casos con una tasa de incidencia (TIA) 3.26 x 1000 habitantes. Los casos de leptospirosis de incremento en la mayoría de distritos y estos datos resaltan la importancia de la vigilancia epidemiológica y posibles medidas de control en los distritos con mayor incremento.


Tabla N°03. Casos de Leptospirosis por inicio de síntomas y distritos de la Provincia de Alto Amazonas, 2024- 2025*

Distritos	2024				2025				Variaciones 2024 - 2025	Comportamiento del año 2025 en relación al 2024
	S.E. N° 31	Acumulado S.E. N° 31	TIA(1000 hab.)	Defunciones	S.E. N° 31	Acumulado S.E. N° 31	TIA(1000 hab.)	Defunciones		
Balsapuerto	1	6	0.33	0	0	15	0.65	0	9	INCREMENTO
Jeberos	1	1	0.18	0	0	4	0.58	0	3	INCREMENTO
Lagunas	0	4	0.27	0	0	78	5.16	0	74	INCREMENTO
Santa Cruz	0	2	0.44	0	0	10	1.86	0	8	INCREMENTO
Tnt. Cesar Lopez Rojas	0	6	0.86	0	0	27	3.82	0	21	INCREMENTO
Yurimaguas	12	277	3.58	0	0	397	3.77	0	120	INCREMENTO
Provincia de Alto Amazonas	14	296	2.32	0	0	531	3.26	0	-12	DISMINUCIÓN

Fuente: Notiweb-Individual

Elaborado: Área de Epidemiología-DIREDSA


Figura N° 08. Tendencia Semanal de Casos de Leptospirosis, Provincia de Alto Amazonas 2022-2025.



Fuente: Notiweb-Individual

Elaborado: Área de Epidemiología-DIREDSA

En 2022 y 2023, los casos de leptospirosis se mantuvieron en niveles bajos con pocos picos de aumento. En 2024, hubo un incremento significativo en el número de casos, con un gran aumento en la segunda mitad del año. El año 2025 en lo que va hasta la S. E. 31, la tendencia de los casos aumentó en comparación con la semana anterior. Esto indica un aumento preocupante en la incidencia de leptospirosis en los últimos años, posiblemente relacionados con factores ambientales, climáticos o de salud pública.

Figura N° 09. Casos de Leptospirosis por grupo de edades Provincia de Alto Amazonas 2025.

La mayoría de casos corresponde a la etapa de vida niño-niña (0-11 años) con 24% (126 casos) seguido por etapa de vida Adulto (30-59 años) con 32% (172 casos), Adulto joven (18 - 29 años) con 19% (100 casos), Adolescentes (12 - 17 años) con el 19% (103 casos) y Adulto Mayor (>60) con 6% (30 casos). Esto sugiere que los niños y adultos son los grupos más afectados, posiblemente debido a factores de exposición ambiental o laborales.

Fuente: Notiweb-Individual
Elaborado: Área de Epidemiología-DIREDSA


2.2 LOXOSCELISMO(X21)

El loxoscelismo es un problema de salud pública ocasionado por la mordedura de la especie *Loxosceles laeta*, que se encuentra, principalmente, en zonas urbanas y suburbanas. Los accidentes loxoscélicos ocurren en su mayoría entre el periodo de primavera y verano, las zonas del cuerpo más frecuentemente afectadas son el muslo, el tronco y la parte proximal de los brazos, y afecta, principalmente, a mujeres, en zonas urbanas, urbano-marginales y dentro del hogar. Hasta la semana N° 31 se reporta 22 casos de Loxoscelismo con un TIA de 0.14 x 1000 hab.

Tabla N° 04. Casos de Loxoscelismo por inicio de síntomas y distritos de la Provincia de Alto Amazonas, 2024-2025.

Distritos	2024				2025				Variación 2024- 2025	Comportamiento del año 2025 en relación al 2024
	31	Acumulado S.E. N° 31	TIA(1000 hab.)	Defunciones	31	Acumulado S.E. N° 31	TIA(1000 hab.)	Defunciones		
Balsapuerto	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	SIN VARIACIÓN
Jeberos	0	0	0.00	0	1	4	0.58	0	4	INCREMENTO
Lagunas	1	2	0.14	0	0	4	0.26	0	2	INCREMENTO
Santa Cruz	0	1	0.22	0	0	0	0.00	0	-1	DISMINUCIÓN
Tnt, Cesar Lopez Rojas	0	0	0.00	0	0	4	0.57	0	4	INCREMENTO
Yurimaguas	0	1	0.01	0	0	10	0.09	0	9	INCREMENTO
Provincia de Alto Amazonas	1	4	0.03	0	1	22	0.14	0	18	INCREMENTO


Fuente: Notiweb-Individual
Elaborado: Área de Epidemiología-DIREDSA

Figura N° 10. Casos de Loxoscelismo por grupos de edad 2025.

El grupo de edad más afectado es la etapa Adulto (30-59 años) con 45% (10 casos), adulto joven (18-29 años) con 14% (3 casos), etapa Adolescentes (12-17 años) con 14% (3 casos), adulto mayor (+60 años) con 23% (5 casos) y la etapa de vida niño(a)(0-11) con 4% (01 caso). (fig. 10).

Fuente: Notiweb-Individual
Elaborado: Área de Epidemiología-DIREDSA

Figura N° 11. Casos de Loxoscelismo en la Provincia de Alto Amazonas 2020-2025.



Fuente: Notiweb-Individual

Elaborado: Área de Epidemiología-DIREDSA

Los casos en 2020-2023 se mantuvieron relativamente estable, con fluctuaciones menores entre 5 y 7 casos; en 2025 hasta la semana 31 solo se han reportado 22 casos lo que parece indicar una disminución en comparación con 2024. Sin embargo, este número podría aumentar a lo largo del año. (fig. 11).

2.3.- OFIDISMO (X20)

Es el síndrome causado por la inoculación de sustancias venenosas de alguna de las serpientes venenosas. Existen unas tres mil especies de serpientes en el mundo, de ellas al menos el 10% son venenosas para el ser humano. Las familias de serpientes consideradas venenosas son cinco: Viperidae, Elapidae, Hydrophidae, Atractaspididae y Colubridae. En el Perú, los nombres de las serpientes están en relación con las aéreas geográficas y cada una adopta un nombre diferente, así tenemos: el género *Lachesis* (shushupe) se encuentra solo en la selva, el género *Crotalus* (cascabel) se encuentra en Sandia (Puno) y Tambopata (Madre de Dios), los géneros *Bothrops* (jergón) y *Micrurus* (corales) se encuentran en la costa, sierra y selva. Este daño es constante en nuestra Provincia sobre todo en épocas de lluvia por eso el personal de salud debe estar capacitado para tomar en forma rápida medidas de acción que no pongan en riesgo la vida del paciente.

En la semana epidemiológica N° 31 se reportó 03 caso de ofidismo, con un Acumulado de 74 casos con una tasa de incidencia acumulada (IA) 0.45 por 1000 habitantes.


Tabla N° 05. Casos de Ofidismo por inicio de síntomas y distritos de la Provincia de Alto Amazonas, 2024- 2025.

Distritos	2024				2025				Variacion 2024- 2025	Comportamiento del año 2025 en relación al 2024
	31	Acumulado S.E. N° 31	TIA(1000 hab.)	Defunciones	31	Acumulado S.E. N° 31	TIA(1000 hab.)	Defunciones		
Balsapuerto	1	8	0.43	0	0	15	0.65	0	7	INCREMENTO
Jeberos	0	4	0.74	0	1	11	1.59	0	7	INCREMENTO
Lagunas	0	13	0.89	0	0	4	0.26	0	-9	DISMINUCIÓN
Santa Cruz	0	3	0.66	0	1	5	0.93	0	2	INCREMENTO
Tnt, Cesar Lopez Rojas	0	11	1.59	1	1	15	2.12	0	4	INCREMENTO
Yurimaguas	2	30	0.39	0	0	24	0.23	0	-6	DISMINUCIÓN
Provincia de Alto Amazon	3	69	0.54	1	3	74	0.45	0	5	INCREMENTO

Fuente: Notiweb-Individual

Elaborado: Área de Epidemiología-DIREDSA

figura N° 12. Tendencia de Casos de Ofidismo, Provincia de Alto Amazonas 2025




Fuente: Notiweb-Individual

Elaborado: Área de Epidemiología-DIREDSAA

En el 2022 se alcanzó una frecuencia relativamente baja de casos semanales, en el año 2023 hay un leve incremento en la variabilidad de casos presentándose hasta 8 casos. En 2024 se mantiene una tendencia similar a 2023, aunque se identifican semanas con picos más altos. En lo que va al 2025 a la S.E. 31 se reporta varios picos, superando 6 casos en ciertas semanas. (Figura N° 12).

Figura N° 13. Casos de Ofidismo por grupo De edad, Provincia de Alto Amazonas 2025.



Fuente: Notiweb-Individual

Elaborado: Área de Epidemiología-DIREDSAA

La mayoría de los casos corresponde a la etapa adulto (30 - 59 años) con 42% (31 casos), seguido con la etapa de Adolescentes (12 - 17 años) con 23% (17 casos), etapa de vida Adulto Joven (18-29 años) con 21% (16 casos), Adulto Mayor (>60) con 7% (05 casos), y etapa de vida niño-niña (0-11 años) con 7% (5 casos).

III.- OTRAS ENFERMEDADES SUJETAS A VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

3.1.- ENFERMEDAD DIARREICA AGUDAS.

3.1.1. ENFERMEDAD DIARREICA AGUDAS ACUOSAS

Las EDAs clasificadas como diarrea aguda acuosa, se define por presentar aumento en frecuencia (3 o más veces en 24 horas), fluidez y/o volumen de las deposiciones en comparación a lo habitual, con pérdida variable de agua y electrolitos y cuya duración es menor de 14 días.

En la SE N° 31 de este año, se notifica 124 con un acumulado de 4797 casos de EDA acuosa TIA 29.47 X 1000, hab. con un 15 % de incremento a comparación del año 2024. (Tabla N°06).

Los incrementos de las EDAs se presentaron en los distritos de Jeberos, Lagunas, Santa Cruz, Tnte. Cesar Lopez Rojas y Yurimaguas. Es crucial reforzar la vigilancia y las acciones preventivas para reducir la incidencia

ya que en estas épocas hay temporadas de lluvias en la selva, ocasionando desbordes de los ríos que vienen afectando a las comunidades por consiguiente afectando a su consumo de agua de la población.


Tabla N° 06. Casos de enfermedad diarreica acuosa en la Provincia de Alto Amazonas, 2024 – 2025.

Distritos	Semanas epidemiológicas SE. N° 31										Variación 2024 - 2025	Comportamiento del año 2025 en relación al 2024		
	2024					2025								
	Nº Episodios SE. 31	Nº Episodios Acumulado	TIA (1000 Hab)	Defunciones SE. 31	Defunciones Acumulado	Nº Episodios SE. 31	Nº Episodios Acumulado	TIA (1000 Hab)	Defunciones SE. 31	Defunciones Acumulado				
Balsapuerto	12	815	44.55	0	0	8	708	27.40	0	0	-107	DISMINUCIÓN		
Jeberos	2	170	31.40	0	0	4	203	29.43	0	0	33	INCREMENTO		
Lagunas	3	518	95.68	0	6	3	572	37.84	0	0	54	INCREMENTO		
Santa Cruz	1	119	26.18	0	0	10	342	63.53	0	0	223	INCREMENTO		
Tnte. Cesar López Rojas	2	219	31.57	0	0	8	339	47.99	0	0	120	INCREMENTO		
Yurimaguas	25	2314	29.91	0	0	91	2633	25.69	0	0	319	INCREMENTO		
Total Alto Amazonas	45	4155	32.66	0	6	124	4797	29.47	0	0	642	INCREMENTO		

Fuente: Notiweb-EDA

Elaborado: Área de Epidemiología-DIREDSA


Figura N° 14. Episodios de diarreicas agudas acuosas por grupos de edad, 2025.



Fuente: NotiWeb. - EDA

Elaborado: Área de Epidemiología-DIREDSA

Figura N° 15. Tendencia de episodios de EDAA, Provincia de Alto Amazonas 2022 – 2025.




Fuente: NotiWeb-EDA

Elaborado: Área de Epidemiología-DIREDSA

Los Episodios de enfermedades diarreas agudas (EDAs), a la S.E. 31, con mayores casos presentados fueron en el grupo de edad de 5 a más años haciendo 52% con (2477 casos), luego los menores de 1 a 4 años con 38% (1841 casos), y con menor casos en los menores de 1 año con 10% (479 casos). (Figura N°14). La tendencia de los casos de diarrea acuosa en 2022 y 2023 presentan una variabilidad moderada, con unas fluctuaciones en el número de casos en 2024 se nota un incremento significativo, con picos más alto en comparación de años anteriores y en este año 2025 hasta la semana 31 nos muestra un incremento (fig.15).

Figura N°16. Canal endémico de episodios de EDAA, Provincia de Alto Amazonas, 2025.



Fuente: Epidemiología _ DIREDSAA

El canal endémico de episodios de EDA acusa en la Provincia de Alto Amazonas nos muestra un incremento en relación con la última semana y se encuentra en **ZONA DE ALARMA**, lo que podría estar relacionado con factores climáticos, calidad del agua o problemas de saneamiento. (Figura N°16).

3.1.2. ENFERMEDAD DIARREICA AGUDAS DISENTÉRICAS.

Diarrea aguda disentérica, se presenta aumento en frecuencia y fluidez de las deposiciones, de volumen escaso o moderado y que además evidencia en las heces sangre visible y moco comúnmente causada por infecciones bacterianas como shigella o entamoeba histolytica. En la S.E 31 EDA disentérica no se presentaron caso, con un acumulado de 80 casos de EDA disentéricas TIA 0.49 X 1000 hab. en general encontramos una disminución en comparación al año 2024. Se debe mantener las medidas preventivas para evitar brotes.


Tabla N° 07. Casos de enfermedad diarreica disentérica, 2024 – 2025.

Distritos	Semanas epidemiológicas SE. N° 31								Variación 2024 - 2025	Comportamiento del año 2025 en relación al 2024		
	2024				2025							
	Nº Episodios SE. 31	Nº Episodios Acumulado	TIA (1000 Hab)	Defunciones SE. 31	Nº Episodios SE. 31	Nº Episodios Acumulado	TIA (1000 Hab)	Defunciones SE. 31				
Balsapuerto	0	10	0.55	0	0	22	0.85	0	0	12		
Jeberos	0	1	0.18	0	1	5	0.72	0	0	4		
Lagunas	0	5	0.92	0	1	16	1.06	0	0	11		
Santa Cruz	0	7	1.54	0	0	9	1.67	0	0	2		
Tnte. Cesar López Rojas	0	0	0.00	0	0	1	0.14	0	0	1		
Yurimaguas	0	12	0.16	0	0	27	0.26	0	1	15		
Total Alto Amazonas	0	35	0.28	0	2	80	0.49	0	1	45		

Fuente: NotiWeb-EDA

Elaborado: Área de Epidemiología-DIREDSAA


Figura N°17. Episodios de enfermedades diarreicas disentéricas por grupos de edad en la Provincia de Alto Amazonas, 2025.



Fuente: NotiWeb-EDA

Elaborado: Área de Epidemiología *Hasta S.E. N°31

Figura N° 18. Porcentaje de episodios de EDAS acuosas y disentéricas por distritos, Provincia de Alto Amazonas, 2025.




Fuente: NotiWeb- EDA

Elaborado: Área de Epidemiología*Hasta S.E. N°31

Los Episodios de enfermedades diarreas agudas disentéricas, hasta la S.E. 31 se presentaron en la etapa de vida de 5 a más años con el 56% con (45 casos), 1-4 años con 34% (27 casos) y <1 año con 8% (10 casos). (Fig. N°17).

Figura N° 19. Canal endémico de episodios de EDA disentéricas, provincia de Alto Amazonas, 2025.



Fuente: NotiWeb-EDA

Elaborado: Área de Epidemiología _ DIREDSA

El canal endémico de episodios de EDA Disentéricas en la provincia de Alto Amazonas nos muestra un incremento en relación a la última semana y se encuentra en **ZONA DE ALARMA**.

3.2.1 INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS (IRA)

Las Infecciones Respiratoria agudas son enfermedades del tracto respiratorio que pueden afectar desde la nariz y garganta (vías respiratorias superiores) hasta los pulmones (vías respiratorias inferiores). Estas infecciones pueden ser causantes por virus o bacterias y se transmiten principalmente por contacto con secreciones o superficies contaminadas. En la Provincia de Alto Amazonas en la S.E. 31 se han notificado 217 episodios de IRA en menores de 5 años, con un acumulado de 9940 casos lo que representa una incidencia acumulada (IA) de 502.93% por cada 1000 menores de 5 años.


Tabla N° 08. Casos de infecciones respiratorias agudas en la Provincia de Alto Amazona, 2024 –2025

Distritos	Semanas epidemiológicas SE N° 31						Variación 2024 - 2025	Comportamiento del año 2025 en relación al 2024		
	2024			2025						
	Nº Episodios SE 31	Acumulado	TIA (1000 Hab)	Nº Episodios SE 31	Acumulado	TIA (1000 Hab)				
Balsapuerto	41	1635	750.34	36	1583	360.43	-52	DISMINUCIÓN		
Jeberos	7	567	879.07	6	569	488.83	2	INCREMENTO		
Lagunas	19	1012	578.95	14	1285	826.37	273	INCREMENTO		
Santa Cruz	4	291	537.89	8	662	900.68	371	INCREMENTO		
Tnte. Cesar López Rojas	7	474	573.85	9	522	670.09	48	INCREMENTO		
Yurimaguas	126	5656	613.85	144	5319	477.51	-337	DISMINUCIÓN		
Total Alto Amazonas	204	9635	635.85	217	9940	502.93	305	INCREMENTO		

Fuente: NotiWeb-IRA

Elaborado: Área de Epidemiología-DIREDSA


Figura N° 20. Episodios de Infecciones Respiratorias Agudas por grupos de edad en la Provincia de Alto Amazonas, 2025.



Fuente: NotiWeb-IRA

Elaborado: Área de Epidemiología *Hasta S.E. N°31

Figura N° 21. Canal endémico de episodios de IRAS en menores de 5 años en la Provincia de Alto Amazonas 2025.



Fuente: NotiWeb-IRA

Elaborado: Área de Epidemiología*Hasta S.E. N°31

La etapa de vida afectadas es (1 a 4 años), con el 73% (7218 casos), seguido (2-11 meses) con el 24% (2413 casos) y la etapa con menor casos (<2 meses), con 3% (309 casos), (fig. 20); en las primeras semanas epidemiológicas del año, los casos se encuentran en la zona de alarma y epidemia. En esta semana se encuentra en **ZONA DE ALARMA** se recomienda fortalecer medidas preventivas, como vacunación, promoción de higiene respiratoria y estrategias de reducción de contagios en poblaciones vulnerables. (fig. 21).

3.2.2 NEUMONIA EN MENORES DE 05 AÑOS.

Es una infección respiratoria que afecta a los pulmones y es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en este grupo etario. Se caracteriza por inflamación y acumulación de líquido en los alvéolos lo que dificulta la respiración. Hasta la S.E. 31 del presente año se notificaron 179 episodios de neumonía, lo que representa una incidencia acumulada (IA) de 9.06 por cada 1000 menores de 5 años. La tasa y el número de episodios de neumonías, en lo que va del año, se presenta una disminución de 9% (17 casos) con respecto del mismo periodo del año 2024. El distrito de Yurimaguas presenta la tasa de incidencia elevada de 10.59 por 1000 menores de 5 años.


Tabla N°09. Casos de Neumonía en menores de 5 años en la Provincia de Alto Amazonas, 2024-2025.

Distritos	Semanas epidemiológicas SE N° 31										Variación 2024 - 2025	Comportamiento del año 2025 en relación al 2024		
	2024				2025									
	Nº Episodios SE 31	Acumulado	TIA (1000 Hab)	Defunciones SE. 31	Defunciones Acumulado	Nº Episodios SE 31	Acumulado	TIA (1000 Hab)	Defunciones SE. 31	Defunciones Acumulado				
Balsapuerto	0	41	18.82	0	0	0	8	1.82	0	1	-33	DISMINUCIÓN		
Jeberos	0	2	3.10	0	1	0	7	6.01	0	0	5	INCREMENTO		
Lagunas	0	19	10.87	0	2	2	31	19.94	0	0	12	INCREMENTO		
Santa Cruz	0	3	5.55	0	0	0	9	12.24	0	0	6	INCREMENTO		
Tnte. Cesar López Rojas	0	5	6.05	0	1	1	6	7.70	0	0	1	INCREMENTO		
Yurimaguas	1	126	13.67	0	1	6	118	10.59	0	0	-8	DISMINUCIÓN		
Total Alto Amazonas	1	196	12.93	0	5	9	179	9.06	0	1	-17	DISMINUCIÓN		

Fuente: NotiWeb-IRA

Elaborado: Área de Epidemiología-DIREDSA


Figura N° 22. Grupos de edad afectados por Neumonías en menores 5 años en la Provincia de Alto Amazonas, 2025.



Fuente: NotiWeb-IRA

Elaborado: Área de Epidemiología *Hasta S.E. N° 31

Figura N° 23. Canal endémico de episodios de Neumonía en menores de 5 años en la Provincia de Alto Amazonas, 2025.



Fuente: NotiWeb-IRA

Elaborado: Área de Epidemiología *Hasta S.E. N° 31

La mayoría de los casos afectados por Neumonías corresponde a niños de los niños de (1 - 4 años) con 62% (111 casos) seguido de (2-11 meses) con 37% (66 casos), y niños (<2 meses) con 1% (2 casos). (fig. 22). Se debe continuar con la vigilancia de dicho daño ya que los menores de 05 años es el grupo más vulnerable. El canal endémico provincial de Neumonías en la provincia de Alto Amazonas nos muestra un aumento en relación a la última semana y se encuentra en **Zona de Epidemiología**. (fig. 23).

3.2.3 SINDROME OBSTRUCTIVO BRONQUIAL AGUDO (SOB/ASMA).

Es un conjunto de signos y síntomas caracterizado por la obstrucción transitoria y reversible del flujo aéreo en los bronquios, generalmente debido a la inflamación, espasmo del músculo liso bronquial y aumento de secreciones. Se manifiesta con sibilancias, disnea, tos y dificultad respiratoria. En la semana S.E. 31 se presentaron 06 casos, con un acumulado de 163 casos con una tasa de incidencia acumulada de 8.06 x cada 1000 menores de 5 años, siendo Yurimaguas el distrito donde se presentan más casos.

El número de episodios de SOB/ASMA en lo que va del año, presenta un Incremento de 57% (59) los casos a lo reportado en el mismo periodo del año 2024.


Tabla N° 10. Casos de SOBA en menores de 5 años, 2024-2025.

Distritos	Semanas epidemiológicas SE N° 31						Variación 2024 - 2025	Comportamiento del año 2025 en relación al 2024		
	2024			2025						
	Nº Episodios SE 31	Acumulado	TIA (1000 Hab)	Nº Episodios SE 31	Acumulado	TIA (1000 Hab)				
Balsapuerto	0	7	3.21	0	0	0.00	-7	DISMINUCIÓN		
Jeberos	0	0	0.00	0	1	0.86	1	INCREMENTO		
Lagunas	0	7	4.00	0	2	1.23	-5	DISMINUCIÓN		
Santa Cruz	0	1	1.85	0	1	1.38	0	SIN VARIACIÓN		
Tnte. Cesar López Rojas	0	1	1.21	0	2	2.56	1	INCREMENTO		
Yurimaguas	4	1	0.11	6	157	13.65	156	INCREMENTO		
Total Alto Amazonas	4	104	6.86	6	163	8.06	59	INCREMENTO		

Fuente: NotiWeb-IRA

Elaborado: Área de Epidemiología-DIREDSAA

Figura N° 24. Episodios de SOB/ASMA por grupos de edad en la Provincia de Alto Amazonas, 2025.




Fuente: NotiWeb-IRA

Elaborado: Área de Epidemiología *Hasta S.E. N° 31

La mayoría de casos presentados corresponden al grupo de edad de < 2 meses con 81% (132 casos) y 2-4 años con 19% (31 casos).

Figura N° 25. Canal endémico de episodios de SOB/ASMA en la Provincia de Alto Amazonas, 2025.



Fuente: NotiWeb-IRA

Elaborado: Área de Epidemiología*Hasta S.E. N° 31

Según el canal endémico provincial nos encontramos en **ZONA de ALARMA** en esta semana del año. Es importante el monitoreo para prevenir brotes y tomar medidas oportunas en caso de aumento de caso.

3.3 VIH/SIDA

El Perú ha logrado contener la propagación del **VIH** en la población general. La principal vía de transmisión continúa siendo la sexual (97% de los casos), seguido por la vertical (2%) y la parenteral (1%). Es fundamental continuar fortaleciendo las políticas públicas, la educación y atención integral para enfrentar eficazmente la epidemia.


Hasta la SE N° 31 de este año, se notifica 59 casos de VIH/SIDA con una incidencia acumulada TIA 0.36 X 1000 hab. De las cuales 34 casos de VIH, 25 casos de SIDA y 7 fallecidos. (tabla N° 11).

Tabla N° 11. Casos de VIH/SIDA, 2024-2025.

Distritos	Población 2025	2024					2025						
		VIH	SIDA	T	GEST	F	TIA	VIH	SIDA	T	GEST	F	TIA
Balsapuerto	25876	5	1	6	2	1	0.22	3	0	3	1	0	0.12
Jeberos	6909	0	0	0	0	0	0.00	2	0	2	0	0	0.29
Lagunas	15200	0	0	0	0	0	0.00	1	0	1	0	1	0.07
Santa Cruz	5378	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00
Teniente Cesar López. R.	7057	0	1	1	0	0	0.14	0	0	0	0	0	0.00
Yurimaguas	102840	82	24	106	5	13	1.29	28	25	53	2	6	0.52
Total provincial	163260	87	26	113	7	14	0.83	34	25	59	3	7	0.36


Fuente: Área de Epidemiología-DIREDSAA

Figura N° 26. Casos de VIH/SIDA por grupos de edad en la Provincia de Alto Amazonas, 2025.



Fuente: Unidad de Epidemiología*Hasta S.E. N° 31

Figura N° 27. Casos de VIH/SIDA, en la Provincia de Alto Amazonas, 2020- 2025.



Fuente: Unidad de Epidemiología*Hasta S.E. N° 31

La mayoría de casos corresponden a la etapa de vida adulto (30-59 años) con 51% (30 casos), adulto joven (18-29 años) con 39% (23 casos), etapa adulto mayor (+60 años) con 5% (03 casos) y etapa adolescente (12-17 años) con 5% (03 casos).

3.4 TUBERCULOSIS (A15, A18)

La tuberculosis (TBC) es una enfermedad infecciosa que suele afectar principalmente a los pulmones y es causada por una bacteria (Mycobacterium tuberculosis). Se transmite de una persona a otra a través de gotitas de aerosol suspendidas en el aire expulsado por personas con enfermedad pulmonar activa. El síntoma principal de la tuberculosis pulmonar activa es tos, a veces con flema que puede ser sanguinolento, dolor torácico, debilidad, pérdida de peso, fiebre y sudoración nocturna.


Hasta la SE N° 31 de este año, se notifica 106 casos de TBC con una incidencia acumulada TIA 1.02 X 1000 hab. De las cuales casos son 73 casos de TBC Pulmonar y 33 casos de TBC Extrapulmonar. (Tabla N° 12).

Tabla N°12. Casos de Tuberculosis, 2024-2025.

Distritos	2024	F	2025	F	IA
Balsapuerto	15	2	10	2	0.99
Jeberos	5	2	1	0	0.18
Lagunas	6	2	5	0	0.48
Santa Cruz	3	1	1	0	0.22
Teniente Cesar López. R.	8	0	1	1	0.43
Yurimaguas	136	23	88	7	1.30
TOTAL	173	30	106	10	1.02


Fuente: Área de Epidemiología-DIREDSA

Figura N° 28. Casos de TBC por grupos de edad en la Provincia de Alto Amazonas, 2025.



Fuente: Unidad de Epidemiología*Hasta S.E. N°31

Figura N° 29. Casos de Tuberculosis, en la Provincia de Alto Amazonas, 2021- 2025.



Fuente: Unidad de Epidemiología*Hasta S.E. N°31

La mayoría de los casos corresponden a la etapa de vida adulto (30-59 años) con 41% (43 casos), seguido del adulto mayor (>60 años) con 22% (23 casos), adulto joven (18 -29 años) con el 27% (29 casos), etapa adolescente (12-17 años) con 10% (9 casos) y etapa de vida niño-niña (5-11 años) con 0% (0 casos) (Figura N°28). Nos muestra un incremento sostenido hasta el 2024, seguido de una reducción en 2025. (fig. 29).

3.5 SÍFILIS (A58)

Sífilis es un problema de salud pública importante a nivel mundial. Es una infección bacteriana causada por **Treponema pallidum** que da lugar a una morbilidad y mortalidad sustanciales. Se trata de una infección de transmisión sexual (ITS) que generalmente se transmite por el contacto con úlceras infecciosas presentes en los genitales, el ano, el recto, los labios o la boca; por medio de las transfusiones de sangre, o mediante la transmisión materna infantil durante el embarazo.

3.5.1 SÍFILIS NO ESPECIFICADA (A51).

La sífilis es una infección sistémica producida por el Treponema Pallidum, se transmite por vía sexual, tanto por sexo oral, vaginal o anal, con una infectividad de alrededor del 30%. En este año 2025 la Provincia de Alto Amazonas hasta la S.E. N° 31, se notificaron 34 casos de Sífilis no Especificada con una tasa de incidencia acumulada (IA) 0.24 X 1000 hab.


Tabla N° 13. Casos de Sífilis no especificada, 2024-2025.

Distritos/ Años	POB > 12 + años 2025	2024			2025		
		Casos	F	TIA	Casos	F	TIA
Balsapuerto	21466	0	0	0.00	3	0	0.14
Jeberos	5976	4	0	1.03	2	0	0.33
Lagunas	13573	1	0	0.10	2	0	0.15
Santa Cruz	4820	0	0	0.00	1	0	0.21
Teniente Cesar López. R.	6426	2	0	0.40	0	0	0.00
Yurimaguas	91340	44	0	0.80	26	0	0.28
Total provincial	143601	51	0	0.56	34	0	0.24

Fuente: NotiWeb-Individual

Elaborado: Área de Epidemiología-DIREDSA


Figura N° 30. Casos de Sífilis no Especificada por grupos de edad en la Provincia de Alto Amazonas, 2025.



Fuente: NotiWeb-Individual

Elaborado: Área de Epidemiología*Hasta S.E. N° 31

Figura N° 31. Casos de Sífilis no Especificada en la Provincia de Alto Amazonas, 2021- 2025.



Fuente: NotiWeb-Individual

Elaborado: Área de Epidemiología*Hasta S.E. N° 31


La mayoría de casos corresponde a la etapa de vida Adulto Joven (18-29 años) con 41% (14 casos), seguido del adulto (30 - 59 años) con 44% (14 casos), Adolescentes (12 - 17 años) con el 6% (2 casos) y adulto Mayor (>60 años) con el 9% (3 casos), (fig. 30) se observa una disminución inicial en 2022, seguida de un repunte en 2023 y 2024. En 2025 hay una disminución de casos. Por lo que se insta a realizar actividades de promoción y prevención. (fig. 31).

IV. VIGILANCIA DE DAÑOS NO TRANSMISIBLE

4.1 VIGILANCIA DE LESIONES DE ACCIDENTES DE TRANSITO


Es el que ocurre sobre la vía y se presenta súbita e inesperadamente, determinado por condiciones y actos irresponsables potencialmente previsibles, atribuidos a factores humanos, vehículos preponderantemente automotores, condiciones climatológicas, señalización y caminos, los cuales ocasionan pérdidas prematuras de vidas humanas y/o lesiones, así como secuelas físicas o psicológicas, perjuicios materiales y daños a terceros.

Figura N° 32. Casos de accidentes de tránsito atendidos por grupos de edad, en la Provincia de Alto Amazonas, 2025.



La mayoría de casos corresponden a la etapa de vida adulto (30-59 años) con 34%, seguido adulto joven (18 -29 años) con el 36% y adolescentes (12-17) con el 15%, etapa vida niño-niña (0-11 años) con 8% y adulto mayor (>60 años con 7%, (Figura N° 32).

Figura N° 33. Casos de accidentes de tránsito, Provincia de Alto Amazonas 2020- 2025.



Fuente: Notiweb-Acctran
Elaborado: Epidemiología DRSAA

Figura N° 34. Casos de Accidentes de Tránsito por lugar de Ocurrencia- 2025.


Calles y/o Avenidas	Casos	% Casos	Calles y/o Avenidas	Casos	% Casos
15 de Agosto	42	13.4	Julio C Arana	1	0.3
Libertad	40	12.8	Moto Cross	1	0.3
Vía de evitamiento	37	11.8	Km. 21 Mariano Melgar	1	0.3
Carretera Ygs-Tarapoto	26	8.3	(en blanco)	1	0.3
Las Américas	16	5.1	Carretera Callao	1	0.3
Zamora	13	4.2	Munichis	1	0.3
Carretera Munichis	10	3.2	Luis Ibarra	1	0.3
Jose Riera	8	2.6	Marañon	1	0.3
Alfonso Ugarte	6	1.9	28 de Julio	1	0.3
Victor Sifuentes	6	1.9	San Martin	1	0.3
Circunvalación carret.	6	1.9	PPJJ 82	1	0.3
Angamos	6	1.9	AAHH Filadelfia	1	0.3
Iquitos	5	1.6	AAHH LA Ramada	1	0.3
Iacna	5	1.6	Bolognesi	1	0.3
Aviación	4	1.3	AAHH Laguna Verde	1	0.3
Mcal. Castilla	4	1.3	Carretera San Rafael	1	0.3
Agrurre	4	1.3	Progreso	1	0.3
Grau	4	1.3	AAHH Pijuyal	1	0.3
AAHH San Juan	4	1.3	Jorge Chavez	1	0.3
Condamine	4	1.3			
Ucayali	3	1.0			
Arica	3	1.0			
Fco. Bardales	3	1.0			
AAHH Violeta Correa	3	1.0			
Km. 30 Santo Tomas	3	1.0			
Comercio	3	1.0			
Mcal. Caceres	3	1.0			
Mi Perú	3	1.0			
Jauregui	2	0.6			
AAHH Iwirnza	2	0.6			
Atahualipa	2	0.6			
Jose Galvez	2	0.6			
AAHH Buena Vista	2	0.6			
AAHH Los Maderos	2	0.6			
Psje. La Loma	2	0.6			
AAHH Independencia	2	0.6			
Maynas	2	0.6			
Garcilazo	2	0.6			
Total	313	100			

Los casos de accidente de tránsito en este año 2025 hasta la S.E 31 hay 313 casos.

4.2. VIGILANCIA DE DIABETES


La diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce. La insulina es una hormona que regula el azúcar en la sangre. El efecto de la diabetes no controlada es la hiperglucemia (aumento del azúcar en la sangre), que con el tiempo daña gravemente muchos órganos y sistemas, especialmente los nervios y los vasos sanguíneos. Tipos de Diabetes tipo 1, Diabetes Tipo 2, Diabetes gestacional.

Figura N°35. Casos de Diabetes por grupos de edad, en la Provincia de Alto Amazonas,2025.



Fuente: Notiweb-Vig. Diabetes
Elaborado: Epidemiología DRSAA

Figura N° 36. Casos de Diabetes, por Ipress, provincia de Alto Amazonas 2024-2025 (SEM 31).




Fuente: Notiweb-Diabetis- Área de Epidemiología DIREDSA

La mayoría de Los casos de diabetes corresponde al Hospital Santa Gema, seguido por Ipress Lagunas, Independencia, Pampa Hermosa,

La mayoría de casos corresponden a la etapa de vida adulto (30-59 años) con 63%, seguido del adulto mayor (>60 años) con 34%, adulto joven (18 -29 años) con el 3% y adolescentes (12-17) con el 0% (Figura N° 35).

Figura N° 37. Casos de Diabetes notificados vs seguimiento, por Ipress, Provincia de Alto Amazonas 2019-2025 (SEM 31).



Fuente: Notiweb -Diabetis-Área de Epidemiología-DIREDSA


Carretera, Aguamiro, Jeberos, Balsapuerto, Santa María, Grau, Villa del Paranapura, Shucushyacu

Figura N° 38. Casos de Diabetes, según tipo de Diabetes, Provincia de Alto Amazonas 2025 (sem 31).



Fuente: Notiweb-Diabetis-Área de Epidemiología-DIREDSA

Figura N° 39. Tipos de Diabetes según atención, Provincia de Alto Amazonas, año 2025 (Sem. 31).



Fuente: Notiweb-Diabetes-Área de Epidemiología-DIREDSA


La mayoría de Los casos de diabetes corresponde a Diabetes Tipo 2 con un 98%, Diabetes tipo 2 con un 0%, Diabetes Gestacional con 0% (Figura N° 38).

4.3. VIGILANCIA DE VIOLENCIA FAMILIAR

La violencia en la familia, principalmente, la cometida contra la mujer, y especialmente la ejercida por su pareja y la violencia sexual, constituye un grave problema de salud pública y una violación de los derechos humanos de las mujeres. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), se estiman que una de cada tres mujeres en el mundo sufre de violencia física y/o sexual de pareja o violencia sexual por terceros en algún momento de su vida. La mayoría de estos casos son violencia infligida por la pareja.


Hasta la S.E 31 la Provincia de Alto Amazonas presentan 157 casos notificados.

Figura N° 40. Casos de Violencia Familiar en la Provincia de Alto Amazonas, 2021 -2025 (SEM 31).



Fuente: Notiweb-viol. Fam.
Elaborado: Epidemiología DRSAA


Figura N° 41. Casos de Violencia Familiar, por Distritos, Provincia de Alto Amazonas. 2021-2025 (SEM. 31).



Fuente: Notiweb-viol. Fam.
Elaborado: Epidemiología DRSAA

La mayoría de Los casos de Violencia Familiar corresponde a la Micro Red de Yurimaguas, seguido de Lagunas, Balsapuerto, y Tnte. Cesar López. (Figura N° 41).


Figura N° 42. Casos de Violencia Familiar, por etapas de vida del agredido(o), Provincia de Alto Amazonas, 2025, (SEM. 31).



Fuente: Notiweb-viol. Fam.
Elaborado: Epidemiología DRSAA

La mayoría de casos corresponden a la etapa de vida adulto (30-59 años) con 45%, seguido del adulto mayor (>60 años) con 3%, adulto joven (18 -29 años), con el 38%, adolescentes (12-17) con el 10% y niño-niña (0-11 años) con 4%.


Figura N° 43. Tipos de Violencia Familiar, Provincia de Alto Amazonas 2025.



Fuente: Notiweb-viol. Fam.
Elaborado: Epidemiología DRSAA

La mayoría de Los casos de Violencia son Psicológica con 62%, seguido de violencia física con 31%, violencia sexual con 7% y abandono con 10 (Figura N° 43).

Figura N° 44. Violencia Familiar, según estado del agresor(a), Provincia de Alto Amazonas, año 2025.



Fuente: Notiweb-viol. Fam.
Elaborado: Epidemiología DRSAA


4.4 Vigilancia de Salud Mental

Se implica la promoción del bienestar, la prevención y el control de los problemas de salud mental, se ha implementado y se desarrolla la vigilancia de problemas de la salud mental priorizados en IPRESS centinela (Centro de Salud Mental Comunitario, Hospital Santa Gema II-2, Munichis, Aguamiro y Loma).

4.4.1 Intento de suicidio


El comportamiento suicida constituye un problema complejo, con múltiples causas interrelacionadas, siendo la enfermedad mental uno de los factores más importante que predispone al comportamiento suicida. Las personas afectadas por enfermedades mentales presentan un riesgo de suicidio diez veces mayor que aquellas personas que no las sufren. Los problemas mentales más a menudo asociados a los comportamientos suicidas son la depresión y los trastornos bipolares, el abuso de drogas y alcohol y la esquizofrenia. El suicidio es la muerte causada por un acto intencional de autolesión que está diseñado para ser mortal. El comportamiento suicida incluye suicidio consumado, intento de suicidio e ideación suicida. Hasta la S.E. 31 se notificaron 19 casos de intento de suicidio, en la Provincia de Alto Amazonas.

figura N°45. Casos de intento de Suicida en la Provincia de alto Amazonas, 2022-2025.




Fuente: Área de Epidemiología-DIREDSA

Figura N° 46. Casos de intentos de Suicidio por grupos de edad en la Provincia de Alto Amazonas, 2025.



Fuente: Área de Epidemiología*Hasta S.E. N°31

Figura N°47. Antecedentes de intento de suicida 2025.




Fuente: Área de Epidemiología*Hasta S.E. N°31

La mayoría de los casos corresponden a la etapa de vida adulto Joven (18-29 años) con 53%, etapa adulta (30-59 años) con 32% adolescentes (12-17) con 10%, adulto mayor (>60 años) con 5% y etapa niño (9-11 años) con 0%. (Figura N°46).

4.4.2 VIGILANCIA DEPRESIÓN MODERADA Y GRAVE.


Los trastornos depresivos se caracterizan por una tristeza de una intensidad o una duración suficiente como para interferir en la funcionalidad y, en ocasiones, por una disminución del interés o del placer despertado por las actividades. Se desconoce la causa exacta, pero probablemente tiene que ver con la herencia, cambios en las concentraciones de neurotransmisores, una alteración en la función neuroendocrina y factores psicosociales. El diagnóstico se basa en la anamnesis. En el tratamiento se utilizan fármacos, psicoterapia o ambos y en ocasiones terapia electroconvulsiva o estimulación magnética transcraneal rápida. Hasta la S.E. 31-2025 se notificaron 90 casos de depresión moderada y grave en este año, en la Provincia de Alto Amazonas.

Figura N°48. Casos de depresión moderada y grave, por IPRESS, provincia de Alto Amazonas, años 2021-2025.




Fuente: Área de Epidemiología-DIREDSA

Figura N° 49. Casos de Depresión por grupos de edad en la Provincia de Alto Amazonas, 2025.



Fuente: Área de Epidemiología*Hasta S.E. N°31

Figura N° 50. Casos de Depresión por Ipress, Provincia Alto Amazonas, 2023-2025.



Fuente: Unidad de Epidemiología*Hasta S.E. N°31

La mayoría de los casos corresponden a la etapa de vida adulto Joven (18-29 años) con 27%, adolescentes (12-17) con el 4%, etapa adulta (30-59 años) con 57%, adulto mayor (>60 años) con 11% y etapa niño (0-11 años) con 1%. (Figura N°49).

4.4.3 VIGILANCIA EPISODIO PSICÓTICO.

Los trastornos psicóticos son trastornos mentales graves que causan ideas y percepciones anormales. Las personas con psicosis pierden el contacto con la realidad. Dos de los síntomas principales son delirios y alucinaciones. Los delirios son falsas creencias, tales como la idea de que alguien está en su contra o que la televisión les envía mensajes secretos. Las alucinaciones son percepciones falsas, como escuchar, ver o sentir algo que no existe.


Hasta la S.E. 31 se notificaron 26 casos de episodio psicótico en este año, en la Provincia de Alto Amazonas.

Tabla N°14. Casos de episodio psicótico, por IPRESS, provincia de Alto Amazonas, años 2021-2025.

IPRESS	2021	2022	2023	2024	2025	Total
C.S.M.C YURIMAGUAS	5	9	19	20	1	54
LA LOMA	0	1	0	0	0	1
HOSPITAL SANTA GEMA	0	1	17	57	25	100
Total	5	11	36	77	26	155

Fuente: Área de Epidemiología-DIREDSA

Figura N° 51. Casos de Episodio Psicótico por grupo etáreo en la Provincia de Alto Amazonas, 2025.



Fuente: Unidad de Epidemiología*Hasta S.E. N°31

La mayoría de casos corresponden al sexo Femenino con 65 % y sexo Masculino con 35% (Figura N°51).

Figura N° 52. Casos de Episodios Psicóticos por Meses, Provincia Alto Amazonas, 2021-2025.

Meses	2021	2022	2023	2024	2025	Total
Ene	0	0	0	3	8	11
Feb	0	2	1	5	7	15
Mar	0	2	3	5	4	14
Abr	0	0	3	6	4	13
May	0	1	3	2	3	9
Jun	0	1	1	20		22
Jul	0	2	3	13		18
Ago	4	2	5	6		17
Sep	1	0	4	0		5
Oct	0	1	8	3		12
Nov	0	0	0	2		2
Dic	0	0	5	12		17
Total	5	11	36	77	26	155

Fuente: Unidad de Epidemiología*Hasta S.E. N°31

4.4.4 VIGILANCIA POR INTOXICACIÓN POR PLAQUICIDAS


La implementación de esta vigilancia epidemiológica en el país, tiene como finalidad de contribuir en la prevención y control de la exposición e intoxicación por plaguicidas en la población del Perú. El objetivo es el de estandarizar la metodología de la vigilancia y establecer la oportunidad de detección de situaciones de alerta y brotes y establecer mecanismos de articulación intersectorial para la vigilancia epidemiológica en salud pública del riesgo por exposición e intoxicación por plaguicidas. Hasta la S.E. 30 se notificaron 08 casos por intoxicación por plaguicidas en este año, en la Provincia de Alto Amazonas.

Tabla N°15. Casos de intoxicación por plaguicidas según IPRESS, provincia de Alto Amazonas, años 2024-2025.

Distrito	2024	2025	%
Yurimaguas	10	3	37.5
Lagunas	0	1	12.5
Jeberos	0	2	25.0
Balsapuerto	0	0	0.0
Tte Cesar Lopez	0	2	25.0
Santa cruz	0	0	0.0
Total	10	8	100

Fuente: Área de Epidemiología-DIREDSA


Figura N° 53. Casos de intoxicación por plaguicidas, por grupo etáreo, provincia Alto Amazonas, año 2025.



Fuente: Unidad de Epidemiología*Hasta S.E. N°31

La mayoría de casos corresponden a la etapa de vida niño-niña (0-11 años) con 12%, seguido por la etapa adulto joven (18-29 años) con 25% etapa adulto mayor (60 a+) con 25%, adulto (30-59 años) con 25%, y etapa Adolescentes (12-17 años) con 13% (Figura N°53).

Figura N° 54. Casos de intoxicación por plaguicidas según signos y síntomas, Provincia Alto Amazonas, 2025.



Fuente: Unidad de Epidemiología*Hasta S.E. N°31



Epidemiológico.

El Boletín Epidemiológico, es la publicación oficial del Área de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, de la Red de Salud de Alto Amazonas. El Boletín, se edita semanalmente a cargo del equipo de la oficina de Epidemiología - DRSAA.

El Boletín Epidemiológico, publica la situación o tendencias de las enfermedades o eventos sujetos a notificación obligatoria, las normas acerca de la vigilancia epidemiológica en salud pública en el Perú, los informes técnicos de brotes y otras emergencias sanitarias, resúmenes de trabajos de investigación desarrollados por el personal de la Red de salud de Alto Amazonas, el Área de Epidemiología y otras informaciones de interés para el personal de salud.

Título:

Boletín Epidemiológico Semanal.

Correo electrónico

Epidel60201@yahoo.com

Web

www.epi.diredsaa.gob.pe

Epidemiológico La información del presente Boletín procede de la notificación de 106 establecimientos de salud. La información contenida en la sección de tendencia del boletín es actualizada cada semana o mes. Los datos y análisis son provisionales y pueden estar sujetos a modificación. Esta información es suministrada semanalmente por la Red de Salud de Alto Amazonas el Área de Epidemiología.

Obst. Percy Sanchez Vergaray.
Director de la Red de Salud A.A

Obst. Jhon James Valles Pérez.
Sub director de la Red de Salud A.A

Lic. Enf. Nelly Lizeth Escobar Ramos.
Área de Epidemiología DRSAA.



Equipo Técnico:

Lic. Enf. Marleny B. Muñoz Quispirina.

C.D. Daniel Barrutia Araujo.

Blgo. Karen Inés Huamán Silva.

Tec. Enf. Ana A. Peltroche Córdova.

Tec. Enf. Lester Vela Tello.

Tec. Enf. Cesia K. Saavedra Shapiama.

Tec. Enf. Segundo Rosbel Soria
Saavedra.